

# Effect of Administration of Acepromazine Combined with Multi vitamin and Amino Acids Complex on Fertility Outcome, Blood Hematological and Biochemical Alterations and the Oxidative Stress Generated by Laparoscopic AI in Ewes

Abbas Farahavar<sup>1\*</sup>, Hamed Ahmadinejad<sup>2</sup>, Daryush Aliour<sup>3</sup>, Hasan Aliarabi<sup>4</sup>

1-Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. (Corresponding author): [a.farahavar@basu.ac.ir](mailto:a.farahavar@basu.ac.ir); [farahavar@gmail.com](mailto:farahavar@gmail.com)

2-Graduated M.Sc. Graduate Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

3- Associated Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

4- Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

Doi:[10.22067/ijasr.2023.83304.1158](https://doi.org/10.22067/ijasr.2023.83304.1158)

**Introduction:** Farm animals face different types of abiotic stresses due to many management activities. Stress has adverse consequences on the animal's health and welfare. Laparoscopic artificial insemination (LAI) in sheep is also one of the mini surgery activities that associated with the use of sedatives, catching and fettering the animal, the insertion of instruments into the abdomen, and manipulation of the reproductive tract. All these actions are stressful and may impact stress axis, hematological and biochemical alterations, antioxidant status and fertility outcome. The administration of acepromazine combined with a multivitamin and amino acids complex may be a useful strategy for reducing stress in sheep undergoing laparoscopic AI.

**Materials and Methods:** In this experiment, 50 non-pregnant Afshar breed ewes, aged 3-4 years, with almost the same body weight and score, were used. The estrous cycle of the ewes was synchronized by flurogestone acetate loaded sponges and eCG hormone. At the time of sponge removal, the ewes were divided into two groups (n = 25). All of the ewes, 54 h after sponge removal, were exposed to stress caused by LAI. In the first group (treatment), with sponge removal, each ewe was received 10 ml of the Multiaminoject intramuscularly. Also, 20 min before LAI, in addition to Multiaminoject, each animal also received 0.0834 mg aspromazine (i.v) per kg of body weight. At the same time, the ewes of the second group were injected with physiological saline and were considered as control. Changes in plasma cortisol concentration and its kinetics were measured from zero (20 min before LAI) to 180 min after through serial blood sampling. Changes of hematological and biochemical parameters of jugular vein blood were evaluated 20 min before and 40 min after LAI. The plasma antioxidant status was measured at the times of sponge removal, LAI and 3 days after LAI. The pregnancy rate was recorded by ultrasound at 45 days.

**Results and Discussion:** Laparoscopic AI induced stress response in the ewes, by that, 20 minutes after LAI, the concentration of cortisol increased significantly compared to the baseline concentration (P < 0.05). In this research, the injection of the aspromazine along with a multivitamins and amino acids complex could not inhibit the secretion of cortisol during laparoscopic surgery, and it caused the rejection of the hypothesis of this research. The reason for this discrepancy is related to the type of sedative used to reduce or eliminate pain during surgery. It has been reported that plasma cortisol response is reduced by ketoprofen is and completely removed by detomidine. As a result, after LAI, the number of white blood cells and the plasma concentration of malodialdehyde increased and the hematocrit, hemoglobin and total antioxidant

capacity decreased ( $P < 0.05$ ), but the concentration of plasma proteins did not change ( $P > 0.05$ ). Acute stressors cause a transient increase in the number of blood cells in the blood circulation. The cause of this phenomenon is the contraction of the spleen due to the stimulation of catecholamines. In addition, with the increase in cortisol secretion, blood cells are released from the bone marrow into the bloodstream. In a study, the use of supplements containing various vitamins and minerals, one week before and one week after laparoscopic surgery, improved the antioxidant status of patients after surgery and the level of plasma malonaldehyde decreased significantly. The reason for not seeing a significant effect on antioxidant parameters in this research may be the type of supplement containing antioxidants and the time of its use before and after surgery. Injection of acepromazine combined with Multiaminoject increased plasma proteins and decreased the level of aspartate aminotransferase enzyme ( $P < 0.05$ ). Depending on its intensity and type, stress causes damage and release of tissue and liver enzymes into the blood. In a research, it was shown that the plasma concentration of aspartate aminotransferase and creatine kinase increases due to transportation stress in pigs. The protective effects of vitamin and amino acid supplements in preventing liver damage have been reported in previous studies. The decrease in enzyme concentration after laparoscopy in the treatment receiving acepromazine and multi amino acids may be related to its protective effects. The results of the study showed that there was no significant difference in fertility outcomes between the two groups ( $P < 0.05$ ). The pregnancy rate for the acepromazine and Multiaminoject-treated group was 50%, while the pregnancy rate for the control group was 45%. This result is probably caused by the lack of interference or partial interference of acepromazine with uterine contractions around ovulation and conception.

**Conclusion:** The authors concluded that acepromazine combined with a multivitamin and amino acids complex, did not have a significant effect on fertility outcome, blood hematological and biochemical alterations and the oxidative stress generated by laparoscopic AI in ewes, but the severity of tissue damage reduce and plasma globulin concentration increase in response to acepromazine combined with a multivitamin and amino acids complex injection. It is important to note that this is just one study and that more research would be needed to confirm these findings.

**Keywords:** Acepromazine, Antioxidant Status, Cortisol, Multiaminoject, Stress

## اثر تزریق اسپرومازین به همراه ترکیب مولتی ویتامین و اسیدهای آمینه بر بازده تولیدمثلی، تغییرات هماتولوژیکی و بیوشیمیایی خون و تنش اکسیداتیو ناشی از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در گوسفند

عباس فرح اور<sup>۱\*</sup>، حامد احمدی نژاد<sup>۲</sup>، داریوش علیپور<sup>۳</sup>، حسن علی عربی<sup>۴</sup>

۱-استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، همدان، ایران

۲-دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، همدان، ایران

## چکیده

آسپرومازین یک داروی آرامبخش است که معمولاً در حیوانات مزرعه‌ای برای کمک به کاهش اضطراب و تنش استفاده می‌شود. همچنین مکمل‌های حاوی ترکیبی از انواع ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه نیز می‌توانند علاوه بر حمایت از سلامت کلی حیوان، به کاهش اثرات منفی تنش کمک نمایند. مطالعات کمی در مورد استفاده از ترکیب آسپرومازین به همراه ترکیب مولتی ویتامین و اسیدهای آمینه بر کاهش اثرات تنش القاء شده هنگام انجام تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در گوسفند وجود دارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق آسپرومازین به همراه یک مکمل تجاری حاوی ترکیبی از ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه (مولتی‌آمینوجکت) بر بازده تولیدمثلی، تغییرات هماتولوژیکی و بیوشیمیایی خون و تنش اکسیداتیو ناشی از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در گوسفند بود. پنجاه راس میش غیر آبستن نژاد افشار با سن ۳-۴ سال، وزن زنده  $57/75 \pm 5/24$  کیلوگرم و نمره بدنی حدود ۴-۳/۵ توسط اسفنج حاوی فلوجستون استات و هورمون eCG همزمان شدند. برای این منظور اسفنج به مدت ۱۴ روز در واژن میش‌ها قرار داده شد. در روز خارج‌سازی اسفنج به هر راس دام ۵۰۰ واحد بین المللی eCG تزریق شد. میش‌ها هنگام خارج‌سازی اسفنج به دو گروه ۲۵ راسی تقسیم و ۵۴ ساعت پس از خارج‌سازی اسفنج، تحت تاثیر تنش تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی قرار گرفتند. به میش‌های گروه اول (شاهد) فقط سرم فیزیولوژی تزریق شد. به میش‌های گروه دوم هنگام خارج‌سازی اسفنج، ۱۰ میلی‌لیتر مکمل مولتی‌آمینوجکت (عضلانی) تزریق شد. همچنین هر حیوان ۲۰ دقیقه قبل از لاپاراسکوپی علاوه بر مولتی‌آمینوجکت، ۰/۰۸۳۴ میلی‌گرم آسپرومازین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده (داخل‌رگی) نیز دریافت کرد. تغییرات غلظت کورتیزول پلاسما و کینتیک آن از ۲۰ دقیقه قبل از انجام لاپاراسکوپی تا ۱۸۰ دقیقه بعد از آن اندازه‌گیری شد. تغییرات هماتولوژیکی و بیوشیمیایی و وضعیت آنتی‌اکسیدانی پلاسما قبل و بعد از لاپاراسکوپی در خون وداجی ارزیابی و میزان آبستنی در ۴۵ روزگی تعیین شد. غلظت کورتیزول ۲۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی بطور معنی‌داری نسبت به غلظت پایه افزایش یافت. متعاقب پاسخ کورتیزول، تعداد گلبول‌های سفید خونی و غلظت مالون‌دی‌آلدهید پلاسما افزایش و هماتوکریت، هموگلوبین و توان آنتی‌اکسیدانی کل کاهش یافت اما، غلظت پروتئین-های پلاسما تغییر نکرد. میزان آبستنی تحت تاثیر تیمار قرار نگرفت اما، پروتئین پلاسما افزایش و آنزیم آسپاراتات آمینوترانسفراز را کاهش داد. بطور کلی تزریق آسپرومازین به همراه مکمل تجاری مولتی‌آمینوجکت هنگام تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی تاثیری بر نتیجه باروری و بهبود وضعیت آنتی‌اکسیدانی پس از لاپاراسکوپی ندارد اما با کاهش غلظت پلاسمایی آنزیم آسپاراتات آمینوترانسفراز شدت آسیب بافتی را کاهش و با افزایش غلظت گلبولین پلاسما سامانه ایمنی حیوان را تقویت می‌کند.

واژه‌های کلیدی: آسپرومازین، کورتیزول، تنش، مولتی‌آمینوجکت، وضعیت آنتی‌اکسیدانی

حیوانات مزرع‌ای به خاطر بسیاری از فعالیت‌های مدیریتی با انواع مختلف تنش‌های غیرزیستی مواجه هستند. تنش دارای پیامدهای نامطلوب بر وضعیت سلامت و رفاه حیوان است (Yardimci *et al.*, 2013). پاسخ حیوان به تنش نه تنها به ماهیت عوامل تنش‌زا و شدت آن بستگی دارد بلکه به استعداد ذاتی حیوان و خلق‌وخوی آن نیز مرتبط است. کنترل پاسخ تنش در حیوانات مزرع‌ای این امکان را فراهم می‌کند تا درک بهتری از وضعیت رفاه حیوان داشته باشیم و شرایط نگهداری و پرورش مناسب‌تری را برای بازدهی بیشتر و یا تولید با کیفیت‌تر فراهم نماییم (Grandin, 2021). هنگام تنش سیستم درون‌ریز تحریک شده و کورتیکواستروئیدهای خون افزایش می‌یابد که پیامد آن تغییر در وضعیت ایمنی، دفاع آنتی‌اکسیدانی، باروری و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و هماتولوژیکی است (Arfuso *et al.*, 2022; Damián & Ungerfeld, 2011; Laher, 2014; Önder *et al.*, 2023; Priskas *et al.*, 2022). آرفوسو و همکاران (Arfuso *et al.*, 2022) نشان دادند که پشم چینی در گوسفند باعث کاهش غلظت آلبومین و افزایش پروتئین‌های فاز حاد بویژه گلوبولین‌ها می‌شود. دومیان و آن‌گرفلد (Damián & Ungerfeld, 2011) نشان دادند که در قوچ اسپرم‌گیری به وسیله الکترواکالاتور باعث افزایش غلظت کورتیزول، کاهش تستوسترون، تغییر در تعداد ضربان قلب و فراسنجه‌های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی خون می‌شود. اوند و همکاران (Önder *et al.*, 2023) نشان دادند که در گوسفند در برنامه‌های تلقیح مصنوعی به روش گذار از گردن رحم و انتقال جنین، تلاش برای عبور دادن ابزارهای کمک تولیدمثلی از دهانه رحم باعث افزایش غلظت کورتیزول خون و کاهش توان آنتی‌اکسیدانی می‌گردد.

تلقیح مصنوعی یک ابزار کارآمد برای بهبود ژنتیکی حیوانات است. با این حال، کاربرد آن در گوسفند به دلیل نتایج متناقض نسبتاً محدود است، زیرا موفقیت روش به عوامل زیادی بستگی دارد. تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپ (LAI) نسبت به تلقیح مصنوعی به روش سنتی دارای برتری است از جمله افزایش دقت و نرخ لقاح بالاتر دارد (Lone, 2022)، و معایب قابل توجهی نیز دارد که قبل از تصمیم به استفاده از این روش در برنامه‌های پرورش گوسفند باید مورد توجه قرار گیرد. تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپ می‌تواند برای گوسفند تنش آفرین باشد، زیرا کاربرد این روش مستلزم مقید کردن حیوان، استفاده از داروهای آرامبخش، قرار دادن ابزارهای لاپاراسکوپ در داخل محوطه شکمی و دستکاری دستگاه تناسلی است (Stafford *et al.*, 2006). سطح تنش بسته به هر گوسفند، مهارت تکنسین تلقیح، کیفیت آرامبخش و مراقبت‌های بعد از تلقیح می‌تواند متفاوت باشد (Small *et al.*, 2021). در شرایط مزرعه استفاده از آرامبخش‌ها، الکترولیت‌ها یا مکمل‌های حاوی اسیدهای آمینه و ویتامین‌ها برای کاستن از اثرات نامطلوب ناشی از انواع مختلف تنش توصیه می‌شود (Ali *et al.*, 2021; Ali & Al-Qarawi, 2002; Danyer *et al.*, 2006). آسپرومازین یک داروی آرامبخش است که معمولاً در دامپزشکی برای کمک به کاهش اضطراب و تنش در حیوانات استفاده می‌شود. مکمل‌های حاوی ترکیبی از انواع ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه نیز می‌تواند به حمایت از سلامت کلی حیوان و کاهش اثرات منفی تنش بر بدن کمک کند (Danyer *et al.*, 2021). اما، در مورد نقش تجویز آسپرومازین همراه با انواع ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه بر پاسخ محور تنش، تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و نتیجه باروری پس از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپ مستندات علمی کمی وجود دارد. بر اساس فرضیه این پژوهش تجویز آسپرومازین همراه با انواع ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه ممکن است یک راهکار مفید برای کاهش تنش در گوسفندان تحت لاپاروسکوپ باشد. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی تزریق

آسپرومازین همراه با یک مکمل تجاری حاوی ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه (مولتی‌آمینوجکت) هنگام LAI بر پاسخ محور تنش، تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و نتیجه باروری بود.

## مواد و روش‌ها

طرح آزمایشی و آماده‌سازی حیوانات

در فصل غیرتولیدمثلی پنجاه راس میش غیرآبستن نژاد افشار با سن ۳-۴ سال وزن زنده  $57/75 \pm 5/24$  کیلوگرم و نمره بدنی حدود ۳/۵-۴ انتخاب و در شرایط تغذیه‌ای و مدیریتی مشابه در طول آزمایش نگهداری شدند. برای همزمان‌سازی فحلی از اسفنج آغشته به ۶۰ میلی‌گرم فلوجستون استات (هیپرای اسپانیا) به مدت ۱۴ روز و ۵۰۰ واحد بین‌المللی eCG (هیپرای اسپانیا) در زمان خارج‌سازی اسفنج استفاده گردید. همه میش‌ها ۵۴ ساعت پس از خارج‌سازی اسفنج، تحت تاثیر تنش ناشی از جراحی لاپاراسکوپی برای انجام تلقیح مصنوعی قرار گرفتند. در گروه اول هنگام خارج‌سازی اسفنج، به هر حیوان ۱۰ میلی‌لیتر از یک مکمل تجاری حاوی اسیدهای آمینه و ویتامین (مولتی‌آمینوجکت، رویان دارو، ایران) بصورت عضلانی تزریق شد. همچنین هر حیوان ۲۰ دقیقه قبل از لاپاراسکوپی، علاوه بر دریافت مولتی‌آمینوجکت،  $0/0834$  میلی‌گرم آسپرومازین (به شکل آسپرومازین مالات، شرکت Pasteur رومانی) به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بصورت داخل‌رگی دریافت کردند. همزمان به میش‌های گروه دوم سرم فیزیولوژی تزریق و به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. ترکیب ویتامینی و اسید آمینه‌ای هر میلی‌لیتر مکمل تزریقی مولتی‌آمینوجکت بر اساس گزارش شرکت داروسازی مربوطه در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱- ترکیب هر میلی‌لیتر مولتی‌آمینوجکت (بر اساس گزارش شرکت تولید کننده دارو).

**Table 1-** The Composition of each milliliter of Multiaminoject (according to the report of the drug manufacturing company)

ویتامین A	واحد بین‌المللی ۱۵۰۰۰	دی پانتنول	۲۵ میلی‌گرم
Vitamin A	15000 IU	D-Panthenol	25 mg
ویتامین D3	۷۵۰۰ واحد بین‌المللی	نیکوتینامید	۵۰ میلی‌گرم
Vitamin D3	7500 IU	Nicotinamide	50 mg
ویتامین E	۲۰ میلی‌گرم	اسید فولیک	۱۵۰ میکروگرم
Vitamin E	20 mg	Folic Acid	150 µg
ویتامین B1	۱۰ میلی‌گرم	بیوتین	۱۲۵ میکروگرم
Vitamin B1	10 mg	Biotin	125 µg
ویتامین B2	۵ میلی‌گرم	کولین کلراید	۱۲/۵ میلی‌گرم
Vitamin B2	5 mg	Choline chloride	12.5 mg
ویتامین B6	۳ میلی‌گرم	اسیدهای آمینه (لیزین، متیونین، آرژنین و گلابسین)	۱۲ میلی‌گرم
Vitamin B6	3 mg	Amino Acids (Lysine, Methionine, Arginine and Glycine)	12 mg
ویتامین B12	۶۰ میکروگرم		
Vitamin B12	60 µg		

۱- شرکت داروسازی رویان دارو، تهران، ایران

## انجام تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی

قبل از انجام لاپاراسکوپی ابتدا همه میسرها به مدت ۱۸ ساعت از آب و خوراک محروم شدند. سپس هر میس بر روی تخت لاپاراسکوپی (کریدل) مقید و پس از ضدعفونی موضع تلقیح، دو سوراخ توسط تروکار در طرفین خط شکمی و نزدیک به پستان ایجاد و محوطه شکمی توسط گاز CO<sub>2</sub> باز گردید. شاخ‌های رحمی با استفاده از تلسکوپ لاپاراسکوپی (لنز صفر درجه با قطر ۵ میلی‌متر ولف، آلمان) متصل به منبع نور سرد (Aesculap، امریکا) رویت و ۰/۵ میلی‌لیتر منی توسط پیپت تلقیح لاپاراسکوپی آسپیره و به دو بخش تقسیم و هر بخش به یک شاخ رحمی تلقیح گردید. عملیات مهار کردن هر گوسفند و بستن آن روی کریدل، انجام لاپاراسکوپی و آزادسازی آن، کمتر از ۵ دقیقه طول کشید. برای تلقیح لاپاراسکوپی از تکنسین کاملاً با تجربه استفاده شد. برای تلقیح از منی تازه انزال شده یک قوچ افشار-برولا که باروری آن قبلاً به اثبات رسیده بود استفاده شد. قوچ مورد استفاده در این پژوهش دو ماه قبل از شروع آزمایش سه ایمپلنت ۱۸ میلی‌گرمی ملاتونین (ریگولین، شرکت Ceva، فرانسه) در زیر گوش آن کاشته شده بود. اسپرم‌گیری با استفاده از واژن مصنوعی انجام شد. منی اخذ شده پس از ارزیابی مقدماتی، توسط رقیق کننده بر پایه شیر خشک (DNAbiotech) و ۵ درصد زرده تخم مرغ و ۵۰۰ واحد بین المللی پنی‌سیلین و ۵۰۰ میکروگرم استرپتومایسین (DNAbiotech) در هر میلی‌لیتر رقیق شد. غلظت نهایی اسپرم برای تلقیح ۱۰۰ میلیون اسپرم در هر میلی‌لیتر بود. منی رقیق شده در زمان تلقیح، در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و بلافاصله تلقیح انجام شد (Fierro *et al.*, 2011).

## ارزیابی پاسخ محور تنش

برای بررسی پاسخ محور تنش و خصوصیات پاسخ کورتیزول پس از لاپاراسکوپی، از هر گروه ۵ راس میس به طور تصادفی جدا و درون باکس‌های انفرادی قرار داده شد. ابتدا ۲۰ دقیقه قبل از انجام لاپاراسکوپی، ۱/۵ میلی‌لیتر خون از طریق وردید و داج اخذ و سپس جراحی لاپاراسکوپی برای انجام تلقیح مصنوعی انجام شد. میسرها پس از لاپاراسکوپی از کریدل پیاده و به داخل باکس‌های انفرادی هدایت شد. سپس خونگیری‌های سریالی در زمان‌های ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی انجام گردید. خون‌های اخذ شده به داخل لوله‌های حاوی K<sub>2</sub>EDTA تخلیه و پس از سانتریفیوژ و جداسازی پلاسما و تا زمان اندازه‌گیری غلظت کورتیزول در فریز -۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. غلظت کورتیزول پلاسما به روش الایزای رقابتی و مطابق دستورالعمل شرکت سازنده کیت (ایده آل تشخیص) اندازه‌گیری شد. حداقل میزان قابل اندازه‌گیری برای کورتیزول ۰/۴۴ μg/dl و مقدار ضریب تغییرات دوران سنجش آن ۴/۵ درصد بود. خصوصیات پاسخ کورتیزول شامل غلظت پایه، غلظت پیک، میزان تغییر نسبت به پایه، طول مدت پاسخ و مساحت زیر منحنی ۰ تا ۹۰ و ۰ تا ۱۸۰ دقیقه به عنوان ملاک پاسخ یکپارچه کورتیزول به روش محاسبه مساحت دوزنقه محاسبه گردید.

## اندازه‌گیری فراسنجه‌های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی خون

برای ارزیابی فراسنجه‌های هماتولوژیکی، ۲۰ دقیقه قبل از لاپاراسکوپی و ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی نمونه خون سیاهرگ و داج به درون لوله‌های حاوی K<sub>2</sub>.EDTA جمع‌آوری و تا زمان اندازه‌گیری فراسنجه‌ها در دمای ۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری

شد. تعداد گلبول‌های قرمز و سفید، درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین، MCV و MCH توسط دستگاه سل کانتر اتوماتیک هماتولوژی (Sysmex-KX21N، ژاپن) اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ۲۰ دقیقه قبل از لاپاراسکوپي و ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپي نمونه خون سیاهرگ وداج به درون لوله حاوی ضد انعقاد هپارین و سدیم فلوراید جمع‌آوری و به کمک سانتریفیوژ (OSK ژاپن، با قدرت ۱۷۰۰ g به مدت ۱۵ دقیقه) پلاسماي آن جدا گردید. پلاسماي تهیه شده تا زمان اندازه‌گیری فراسنجه‌ها در فریز ۲۰- نگهداری شد. غلظت گلوکز پلاسما به روش آنزیمی-کالریمتری، پروتئین کل به روش فتومتریک بیوره، آلومین به روش فتومتریک بروم کروزل گرین و فعالیت آنزیم آسپارات آمینوترانسفراز بر اساس روش توصیه شده IFCC (فدراسیون بین المللی شیمی بالینی و علوم آزمایشگاهی) و توسط کیت‌های شرکت پارس آزمون (تهران، ایران) و به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد.

### اندازه‌گیری توان آنتی‌اکسیدانی کل و مالون دی‌آلدهید پلاسما

میزان توان آنتی‌اکسیدانی کل و غلظت مالون دی‌آلدهید پلاسما در زمان خارج‌سازی اسفنج، ۲۰ دقیقه قبل و ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپي و همچنین ۳ روز بعد از لاپاراسکوپي اندازه‌گیری شد. برای این منظور نمونه خون سیاهرگ وداج در زمان های ذکر شده به داخل لوله حاوی هپارین جمع‌آوری و پلاسماي تهیه شده تا زمان اندازه‌گیری فراسنجه‌ها در فریز ۸۰- نگهداری شد. وضعیت آنتی‌اکسیدانی از طریق اندازه‌گیری توان آنتی‌اکسیدانی کل پلاسما به روش فراب (Hsieh & Rajashekaraiyah, 2021) و غلظت مالون دی‌آلدهید پلاسما از طریق ارزیابی غلظت ترکیبات واکنش دهنده با تیوباریتوریک اسید (De Leon & Borges, 2020) تعیین شد.

### تشخیص آبستنی

آبستنی میش‌ها ۴۵ روز پس از تلقیح لاپاراسکوپي با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی مجهز به پروب کانوکس ۳/۵ مگاهرتز (Sonosite، اسپانیا) به روش معاینه شکمی تشخیص داده شد.

### آنالیز آماری

داده‌های مربوط به خصوصیات پاسخ کورتیزول به روش آنالیز واریانس و در قالب طرح کاملاً تصادفی و داده‌های مربوط به توان آنتی‌اکسیدانی کل پلاسما، غلظت مالون دی‌آلدهید پلاسما، فراسنجه‌های متابولیکی و هماتولوژی و غلظت کورتیزول در خونگیری‌های سریالی در قالب طرح کاملاً تصادفی با اندازه‌گیری‌های تکرار شده در زمان به کمک نرم افزار SAS (ورژن ۹/۴) و رویه GLM تجزیه و تحلیل شد. درصد آبستنی در ۴۵ روزگی با استفاده از آزمون کای مربع و رویه Freq و به کمک نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل گردید. به دلیل احتمال اثرات منفی تنش ناشی از خونگیری‌های سریالی، داده‌های آبستنی میش‌های جداسازی شده برای تعیین کینتیک کورتیزول پلاسما در آنالیز آماری مورد استفاده قرار نگرفت. اختلاف بین میانگین زمان‌های نمونه‌گیری با استفاده از آزمون دانکن با احتمال خطای کمتر از ۵ درصد ( $p < 0.05$ ) مقایسه شد. همچنین از آزمون t- student برای مقایسه بین دو تیمار استفاده گردید.


## نتایج و بحث

### پاسخ محور تنش

نتایج مربوط به تغییرات غلظت کورتیزول پلازما از ۲۰ دقیقه قبل از انجام لاپاراسکوپی تا ۱۸۰ دقیقه بعد از آن در شکل ۱ و کینتیک کورتیزول پلازما در جدول ۲ نشان داده شده است. غلظت پایه کورتیزول پلازما بین تیمارها تفاوت معنی‌داری نداشت. انجام عمل لاپاراسکوپی باعث افزایش غلظت کورتیزول پلازما می‌شود بطوری‌که، پیک کورتیزول ۲۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی مشاهده گردید و غلظت کورتیزول در این زمان بطور معنی‌داری نسبت به غلظت پایه بالاتر بود ( $P < 0.05$ ).

غلظت کورتیزول در پیک تحت تاثیر تیمار قرار نگرفت و تزریق اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت تاثیری بر غلظت کورتیزول در پیک نداشت اما، از نظر عددی میانگین غلظت کورتیزول در میش‌های تیمار شده بیشتر از میش‌های گروه شاهد بود. مدت زمان پاسخ و همچنین مساحت زیر منحنی، ۹۰ و ۱۸۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی بین تیمارها تفاوتی نداشت.





**شکل ۱-** تغییرات غلظت کورتیزول پلاسما در میش‌ها پس از انجام تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی (LAI) و اثر تزریق اسپرومازین به همراه یک مکمل تجاری حاوی مولتی ویتامین و اسیدهای آمینه (مولتی آمینوجکت). شاهد: فقط سرم فیزیولوژی تزریق گردید. تیمار ACM: هنگام خارج‌سازی اسفنج، به هر حیوان ۱۰ میلی‌لیتر مکمل مولتی آمینوجکت (عضلانی) تزریق شد. همچنین هر حیوان ۲۰ دقیقه قبل از لاپاراسکوپی علاوه بر مولتی آمینوجکت، ۰/۰۸۳۴ میلی‌گرم اسپرومازین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده (داخل‌رگی) نیز دریافت کرد. تغییرات غلظت کورتیزول پلاسما در بازه زمانی صفر (۲۰ دقیقه قبل از انجام لاپاراسکوپی) تا ۱۸۰ + ۱۸۰ دقیقه بعد از انجام لاپاراسکوپی اندازه‌گیری شده است.

**Figure 1-** Changes of plasma cortisol concentration of ewes after performing laparoscopic artificial insemination (LAI) and the effect of Acepromazine combined with a commercial supplement contained multi-vitamins and amino acids (Multi Aminoject). Control: received only saline. ACM group: with sponge removal, each ewe was received 10 ml of the Multiaminoject (IM). Also, 20 min before LAI, in addition to Multi Aminoject, each animal received 0.0834 mg Acepromazine (i.v) per kg of body weight. Changes in plasma cortisol concentrations were measured from zero (20 min before LAI) to 180 min after.

این نتیجه با نتایج استافورد و همکاران (Stafford *et al.*, 2006) همخوانی داشت بود. آنها نشان دادند که مقید کردن گوسفند روی کریدل و انجام لاپاراسکوپي باعث افزایش قابل توجه سطح کورتیزول پلاسما می‌گردد و استفاده از اسپرومازین نمی‌تواند ترشح کورتیزول را مهار نماید. همچنین مشابه نتایج این پژوهش در مطالعه‌ای نشان داده شد که در گاوهایی که تحت تنش حمل و نقل قرار داشتند، تزریق اسپرومازین قبل از شروع تنش، غلظت پلاسمایی کورتیزول را نسبت به گاوهای گروه شاهد که فقط سرم فیزیولوژی دریافت کرده بودند کاهش نداد (Brearley *et al.*, 1990). آماده‌سازی گوسفند برای تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپي شامل اقداماتی از قبیل محروم‌سازی آن از آب و خوراک به مدت حداقل ۱۸ ساعت

جدول ۲- کینتیک کورتیزول پلاسما (بر حسب نانوگرم در لیتر) در پاسخ به به انجام تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپي و تاثیر استفاده از اسپرومازین به همراه یک مکمل حاوی مولتی ویتامین و اسیدهای آمینه (مولتی آمینوژکت) بر فراسنجه‌های پاسخ در میش‌های نژاد افشار<sup>۱</sup>.

Table 2. Plasma cortisol kinetic (ng/L) to perform laparoscopic artificial insemination (LAI) and the effect of administration of Acepromazine combined with multivitamin and amino acids (Multiaminoject) on response parameters in Afshar ewes.

تیمارها Treatments	غلظت پایه Basal concentration	غلظت پیک Peak concentration	میزان تغییر (پایه-پیک) Change (peak- Basal)	AUC <sub>(0-90)</sub> (nmol/min/L) × 10 <sup>3</sup>	AUC <sub>(0-180)</sub> (nmol/min/L) × 10 <sup>3</sup>
Control	38.65	151.27	112.61	9.21	17.44
ACM <sup>۲</sup>	37.02	199.39	162.37	13.07	23.27
SEM	5.090	23.341	19.712	2.033	3.601
P-value	0.8614	0.1915	0.1208	0.2164	0.2852

۱-AUC: مساحت زیر منحنی نمودار کورتیزول است که برای بازه‌های زمانی صفر تا ۹۰ و صفر تا ۱۸۰ محاسبه شده است و به عنوان پاسخ یکپارچه کورتیزول در نظر گرفته شده است.  
۲-ACM: اسپرومازین به همراه مولتی آمینوژکت.

قبل از لاپاراسکوپي، گرفتن و مقید کردن حیوان روی تخت لاپاراسکوپي، سوراخ کردن پوست ناحیه شکمی توسط تروکار، تزریق گاز CO<sub>2</sub> به محوطه شکمی و دستکاری اندام‌های داخلی به منظور یافتن دستگاه تولید مثلی و تلقیح است. همه این اقدامات منابع بالقوه القاء تنش هنگام تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپي هستند. تنش باعث فعال شدن محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) می‌شود که نتیجه آن ترشح کورتیزول و کاته‌کولامین‌ها به داخل خون است. در این پژوهش تزریق مولتی آمینوجکت به همراه آرامبخش اسپرومازین نتوانست ترشح کورتیزول را هنگام جراحی لاپاراسکوپي مهار نماید و باعث رد فرضیه این پژوهش گردید. تاثیر آرامبخش‌های مختلف بر کاهش سطح تنش و کنترل پاسخ کورتیزول باهم متفاوت است و علت این تناقض به نوع آرامبخش مورد استفاده برای کاهش یا رفع احساس درد در هنگام جراحی مربوط است. گزارش شده است که پاسخ کورتیزول پلاسما هنگام استفاده از کتوپروفن کاهش می‌یابد و توسط دتومیدین بطور کامل رفع می‌گردد (Stafford *et al.*, 2006). در مطالعه دیگری نشان داده شد که زایلازین و دتومیدین باعث کاهش سطح تنش در بزها هنگام انتقال جنین‌های کلون شده به روش لاپاراسکوپي می‌گردد (Aghamiri *et al.*, 2022) دتومیدین معمولاً به عنوان یک آرامبخش برای تسهیل روش‌های جراحی و به عنوان یک داروی بیهوشی در اسب استفاده می‌شود. این ماده معمولاً در گوسفند استفاده نمی‌شود، اما نشان داده شده است که در این گونه حیوانی حالت ضد درد ایجاد می‌کند (Stafford *et al.*, 2006). در این پژوهش غلظت پلاسمایی کورتیزول در تیمار دریافت کننده اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت به طور جزئی (غیر معنی‌دار) بیشتر از شاهد بود. استافورد و همکاران (Stafford *et al.*, 2006) که نشان دادند که تسکین درد با استفاده از اسپرومازین باعث تحریک جزئی محور HPA و افزایش کوتاه مدت کورتیزول پلاسما هنگام لاپاراسکوپي در گوسفند می‌شود. نتایج این پژوهش با نتایج آنها همخوانی داشت. همچنین نشان داده شده است که تزریق اسپرومازین هنگام تنش حمل و نقل، کورتیزول پلاسما را افزایش می‌دهد (Brearley *et al.*, 1990) که با نتیجه این پژوهش مطابقت دارد. علت افزایش کورتیزول پلاسما (هایپرکوتیزولیمیا) پس از تزریق اسپرومازین، به مدت اثر این دارو مربوط است. اسپرومازین نسبتاً طولانی اثر بوده و پس از تزریق باعث تحریک ترشح هورمون‌های آدرنالین و آدرنوکورتیکوتروپین (ACTH) می‌شود که می‌تواند باعث افزایش کورتیزول پلاسما گردد (Ali & Al-Qarawi, 2002). نشان داده شده است که تزریق اسپرومازین و همزمان شروع تنش حمل و نقل، کورتیزول پلاسما را بیشتر از زمانی که تنش وجود ندارد افزایش می‌دهد (Brearley *et al.*, 1990). علاوه بر آرامبخش‌ها، تاثیر استفاده از انواع مکمل‌های حاوی الکترولیت‌ها، ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه برای مهار ترشح کورتیزول هنگام مواجهه با عوامل تنش‌زا در مطالعات مختلف گزارش شده است (Tsuda *et al.*, 2020). استفاده از مکمل‌های حاوی انواع ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه در مواقع استرس ناشی از واکسیناسیون، حمل و نقل، رطوبت بالا، درجه حرارت بالا، تغییرات ناگهانی درجه حرارت باعث کاهش اثرات نامطلوب تنش می‌گردد (Nayyar & Jindal, 2010). در این پژوهش استفاده از تزریق همزمان مولتی آمینوجکت با اسپرومازین تاثیری بر مهار ترشح کورتیزول نداشت (جدول ۲). نشان داده شده‌است که گرسنگی کوتاه مدت باعث تخلیه بدن از گلیکوژن و کاهش گلوکز خون می‌شود که باعث تحریک ترشح کورتیزول می‌گردد (Kiyama *et al.*, 2004). هسمو با نتایج این پژوهش، گزارش شده‌است که در انسان استفاده از اسیدهای آمینه شاخه‌دار قبل از انجام تمرینات ورزشی مقاومتی و طولانی مدت پاسخ کورتیزول را تحت تاثیر قرار نداد (Tsuda *et al.*, 2020). در مطالعه دیگری مصرف مکمل‌های حاوی اسیدهای آمینه شاخه‌دار ضروری و تائورین تاثیر معنی‌داری بر ترشح

کورتیزول نداشت (Hoffman *et al.*, 2008). بر خلاف نتایج این پژوهش، در مطالعه‌ای استفاده از آرژنین باعث افزایش متابولیسم لیپید در جوندگان و انسان و حفظ سطح گلوکز خون و گلیکوژن کبد گردید و پیشنهاد گردید که احتمالاً آرژنین می‌تواند باعث مهار ترشح کورتیزول شود (Jobgen *et al.*, 2009; McKnight *et al.*, 2010). توانایی سرکوب ترشح کورتیزول توسط نوع مکمل‌های ویتامینی و اسید آمینه‌ای متفاوت است و بستگی به ترکیب و غلظت آن در هر مکمل دارد. ترکیب اسید آمینه‌ای مورد استفاده در این پژوهش حاوی لیزین، متیونین، آرژنین و گلایسین بود که می‌تواند علت مغایر بودن نتایج این پژوهش با مطالعات سایر محققین باشد. البته شایان ذکر است که علت عدم تاثیر تزریق مولتی آمینوجکت بر مهار ترشح کورتیزول ممکن است به شدت و نوع عامل تنش زا، نوع و ترکیب اسید آمینه و نوع گونه حیوانی نیز بستگی داشته باشد.

#### فراسنجه‌های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی

اثر تزریق اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت بر تغییرات فراسنجه‌های هماتولوژیکی ۲۰ دقیقه قبل و ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی در جدول ۳ نشان داده شده است. تعداد گلبول‌های سفید خونی و غلظت گلوکز پلاسما ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی نسبت به ۲۰ دقیقه قبل از لاپاراسکوپی به‌طور معنی‌داری بیشتر و درصد هماتوکریت، غلظت هموگلوبین، حجم متوسط گلبول‌های قرمز (MCV) و غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز (MCH) کمتر بود ( $P < 0/05$ ) اما، تزریق اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت تاثیری بر این فراسنجه‌ها نداشت. اثر تزریق اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت بر تغییرات بیوشیمیایی خون ۲۰ دقیقه قبل و ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی در جدول ۴ نشان داده شده است. غلظت پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین پلاسما ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی تفاوت معنی‌داری با قبل از لاپاراسکوپی نداشت اما، غلظت فراسنجه‌های ذکر شده در تیمار دریافت کننده اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت بیشتر از شاهد بود ( $P < 0/05$ ).

گزارش شده است که عوامل تنش‌زای حاد باعث افزایش گذرای تعداد سلول‌های خونی در گردش خون می‌شود. این پدیده ناشی از انقباض طحال در اثر تحریک کاته‌کولامین‌هاست. همچنین هنگام تنش، با میانجی‌گری کورتیزول، یک نوع رهاسازی سلول‌های خونی از مغز استخوان به جریان خون نیز رخ می‌دهد (Arfuso *et al.*, 2023). بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش برخی از فراسنجه‌های هماتولوژیکی ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی بطور معنی‌داری نسبت به قبل از لاپاراسکوپی متفاوت بود ( $P < 0.05$ ). در این پژوهش افزایش تعداد گلبول‌های سفید خونی پس از تنش ناشی از لاپاراسکوپی، با یافته‌های مطالعات پیشین همسو بود (Arfuso *et al.*, 2023). گزارش شده است که تنش‌های روانی و همچنین احساس درد، سیستم هماتولوژیکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث افزایش تعداد گلبول‌های سفید خونی می‌شود (Ballou *et al.*, 2013). در این پژوهش تیمار آسپرومازین به همراه مولتی آمینوژکت تعداد گلبول‌های سفید خونی را تحت تاثیر قرار نداد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تیمار یاد شده نتوانست افزایش تعداد گلبول‌های سفید خونی و افزایش تعداد گلبول‌های سفید خونی را مهار

**جدول ۳-** تنش ناشی از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی (LAI) و اثر پیش تیمار آسپرومازین به همراه یک مکمل حاوی اسیدهای آمینه و ویتامین بر تغییرات فراسنجه‌های هماتولوژیکی در گوسفندان نژاد افشار.

**Table 3-** Laparoscopic AI associated stress and the pretreatment effect of Acepromazine combined with multivitamin and amino acids (Multiaminoject) on hematologic parameters alterations in Afshar ewes

تیمارها Treatments	WBC×(10 <sup>3</sup> μl) <sup>1</sup>	RBC×(10 <sup>6</sup> μl) <sup>2</sup>	Hct (%) <sup>3</sup>	Hb (g/dl) <sup>4</sup>	MCV (fl) <sup>5</sup>	MCH (Pg) <sup>6</sup>
Control	8.70	9.64	31.90	10.38	34.09	11.12
ACM <sup>7</sup>	8.46	9.75	32.63	10.86	34.99	11.48
SEM	0.563	0.452	1.075	0.375	1.791	0.638
Time						
20 min before laparoscopy	8.04	9.80	34.13	11.58	39.40	13.10
40 min after laparoscopy	9.50	10.11	29.89	9.55	29.71	9.47
SEM	0.480	0.573	1.162	0.341	1.801	0.595
<i>P-value</i>						
<i>Treat</i>	0.8703	0.8554	0.7331	0.6650	0.8967	0.8952
<i>Time</i>	0.0467	0.7021	0.0121	0.0003	0.0005	0.0001
<i>Treat×Time</i>	0.2740	0.4313	0.4928	0.4597	0.9765	0.7981

۱-WBC: تعداد گلبول‌های سفید خونی (بر حسب تعداد در هر میکرولیتر خون)، ۲-RBC: تعداد گلبول‌های قرمز خونی (بر حسب تعداد در هر میکرولیتر خون)، ۳-Hct: هماتوکریت (بر حسب درصد)، ۴-Hb: غلظت هموگلوبین خون (بر حسب گرم در دسی‌لیتر)، ۵-MCV: حجم متوسط گلبول‌های قرمز (بر حسب فمتولیتزر)، ۶-MCH: مقدار متوسط هموگلوبین در گلبول‌های قرمز (بر حسب پیکوگرم)، ۷-ACM: آسپرومازین به همراه مولتی آمینوژکت.

1-WBC: white blood cells (cells number per microliter of blood), 2-RBC: red blood cells (cells number per microliter of blood), 3-Hct: Hematocrit, 4- Hb: hemoglobin concentration, 5- MCV: mean corpuscular volume (femtoliter), 7- MCH: mean corpuscular hemoglobin (picogram), 7-ACM: Acepromazine combined with Multi-Aminoject.

کند که با نتایج بدست آمده از پژوهش بالوآ و همکاران (Ballou *et al.*, 2013) مغایرت داشت آنها نشان دادند که اخته کردن و شاخ‌بری باعث افزایش تعداد گلبول‌های سفید خونی می‌شود و استفاده از آرامبخش افزایش تعداد گلبول‌های سفید خونی را مهار می‌کند (Ballou *et al.*, 2013). همسو با این پژوهش، دامیان و آنگرفلد (Damián & Ungerfeld, 2011) نشان دادند که اسپرم‌گیری از قوچ با استفاده از الکترواچاکولاتور باعث افزایش گلوکز پلاسما و کاهش هماتوکریت و هموگلوبین می‌شود. علی و همکاران (Ali *et al.*, 2006) نیز نشان دادند که حمل جاده‌ای گوسفند و بز باعث کاهش هماتوکریت و افزایش هموگلوبین می‌گردد. برخلاف یافته این پژوهش، ۴۰ ساعت حمل نقل باعث افزایش درصد هماتوکریت و هموگلوبین در تلیسه‌ها شد (Avila-Jaime *et al.*, 2021). همچنین پارکر و همکاران (Parker *et al.*, 2004) تغییری در درصد

هماتوکریت گاوهای گوشتی پس از ۹۰ ساعت محرومیت از آب مشاهده نکردند. آرفوسو و همکاران (Arfuso et al., 2022) نشان دادند که تعداد گلبول‌های سفید خونی، درصد هماتوکریت و هموگلوبین، MCV و MCH در میش‌ها ۵ و ۱۲۰ دقیقه بعد از عملیات پشم‌چینی تفاوت معنی‌داری با قبل از آن ندارد. همسو با نتایج پژوهش حاضر علی و همکاران (Ali et al., 2006) نشان دادند که تزریق زایلازین و سدیم بتائین قبل از حمل و نقل تاثیری بر تغییرات هماتولوژیکی رخ داده در اثر تنش حمل و نقل ندارد. علت نتایج متناقض به زمان نمونه‌گیری مربوط است. باتوجه به گذرا بودن تغییرات هماتولوژیکی ناشی از تنش، ممکن است نمونه‌گیری‌های دیر هنگام باعث محو شدن تغییرات نسبت به مقادیر پایه گردد (Arfuso et al., 2022). علاوه بر آن در صورت بروز دهیدراتاسیون در حیوان، درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین افزایش می‌یابد. بنابراین تغییرات هماتولوژیکی در مطالعات مختلف به نوع تنش، تفاوت‌های ژنتیکی و شرایط آب و هوایی در حین آزمایش نیز مرتبط است. افزایش مشاهده شده در گلوکز پلاسما ناشی از افزایش ترشح کاته‌کولامین‌ها و کورتیزول پس از لاپاراسکوپی است که منجر به تحریک گلوکوکورتیزول و افزایش گلوکز خون می‌گردد (Arfuso et al., 2022).

**جدول ۴-** تنش ناشی از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی (LAI) و اثر تیمار اسپرومازین به همراه یک مکمل حاوی اسیدهای آمینه و ویتامین بر تغییرات فراسنجه‌های بیوشیمیایی پلاسما در گوسفندان نژاد افشار.

**Table 4-** Laparoscopic AI associated stress and the pretreatment effect of Acepromazine combined with multivitamin and amino acids (Multi Aminoject) on alterations of biochemical parameters in Afshar ewes.

تیمارها Treatment	گلوکز Glucose (mg/dl)	پروتئین کل Total protein (g/dl)	آلبومین Albumin (g/dl)	گلوبولین Globulin (g/dl)	آسپاراتات آمینوترانسفراز AST (U/L) <sup>1</sup>
Control	87.16	8.05 <sup>b</sup>	1.66 <sup>b</sup>	6.42 <sup>b</sup>	89.32
ACM <sup>2</sup>	91.29	9.25 <sup>a</sup>	1.87 <sup>a</sup>	7.38 <sup>a</sup>	74.43
SEM	6.086	0.248	0.058	0.198	6.261
Time					
20 min before laparoscopy	72.89	8.59	1.73	6.86	81.38
40 min after laparoscopy	106.85	8.80	1.80	7.01	82.37
SEM	4.483	0.261	0.054	0.208	7.222
<i>P-value</i>					
<i>Treat</i>	0.6239	0.0005	0.0053	0.0005	0.1422
<i>Time</i>	0.0001	0.5971	0.4170	0.5971	0.9231
<i>Treat × Time</i>	0.2621	0.5170	0.2971	0.5170	0.0660

<sup>1</sup>-AST: فعالیت آنزیم آسپاراتات آمینوترانسفراز (بر حسب واحد در لیتر)، <sup>2</sup>-ACM: اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت. حروف غیر مشترک در داخل هر ستون در هر بخش تفاوت معنی‌دار را بین تیمارها نشان می‌دهد ( $P < 0.05$ ).

1-AST: aspartate aminotransferase activity (unit/ litter), 2-ACM: Acepromazine combined with Multi-Aminoject. Different letters in each column of each part indicate significant difference between groups ( $P < 0.05$ ).

اثر تزریق اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت بر تغییرات فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ۲۰ دقیقه قبل و ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی در جدول ۴ نشان داده شده است. در پاسخ به تنش‌های حاد، واسطه‌های پیش التهابی باعث تحریک پاسخ فاز حاد شده و کبد را وادار به تولید پروتئین‌های فاز حاد می‌کند و غلظت پروتئین‌های پلاسما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش غلظت آلبومین، گلوبولین و پروتئین کل تحت تاثیر جراحی لاپاراسکوپی قرار نگرفت (جدول ۴). همسو با این پژوهش، در مطالعه‌ای در بره‌های مقید شده و محروم از آب و خوراک، غلظت سرمی کورتیزول نسبت به بره‌هایی که تحت تنش نبودند افزایش یافت اما، غلظت سرمی آلبومین و پروتئین کل تحت تاثیر قرار نگرفت (Apple *et al.*, 1993). مغایر با نتایج این پژوهش، تنش ناشی از حمل و نقل جاده‌ای در اسب‌ها باعث افزایش غلظت پروتئین کل گردید (Arfuso *et al.*, 2023). همچنین آرفوسو و همکاران (Arfuso *et al.*, 2022) نشان دادند که پس از پشم چینی در گوسفند غلظت آلبومین خون کاهش و غلظت گلوبولین‌های آلفا و بتا-۲ افزایش می‌یابد. همچنین دامیان و آنگرفلد (Damián & Ungerfeld, 2011) نشان دادند که ۳۰ و ۱۲۰ دقیقه پس از تنش الکترواجاکولاتور در قوچ، غلظت پروتئین کل پلاسما افزایش می‌یابد اما تغییری در غلظت آلبومین رخ نمی‌دهد. تاثیر عوامل تنش‌زا بر غلظت پلاسمایی پروتئین را نمی‌توان به همه

**جدول ۵-** تنش ناشی از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی (LAI) و اثر پیش تیمار اسپرومازین به همراه یک مکمل حاوی اسیدهای آمینه و ویتامین بر غلظت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز (AST) قبل و پس از لاپاراسکوپی<sup>۱</sup>.

**Table 5-** Laparoscopic AI associated stress and the pretreatment effect of Acepromazine combined with multivitamin and amino acids (Multi Aminoject) on plasma aspartateaminotransferase activity before and after LAI in Afshar ewes<sup>1</sup>.

تیمارها Treatments	۲۰ دقیقه قبل از لاپاراسکوپی 20 min before laparoscopy	۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی 20 min after laparoscopy
Control	79.40	99.25 <sup>a</sup>
ACM <sup>1</sup>	83.37	65.50 <sup>b</sup>
SEM	10.21	7.452
<i>P value</i>	0.8009	0.0096

۱-ACM: اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت . حروف غیر مشترک در داخل هر ستون تفاوت معنی‌دار را بین تیمارها نشان می‌دهد ( $P < 0.05$ ).

1-ACM: Acepromazine combined with Multi Aminoject. Different letters in each column indicate significant difference between groups ( $P < 0.05$ ).

نوع عوامل تنش‌زا تعمیم داد و ممکن است توسط نوع عامل تنش‌زا و سایر شرایط محیطی تحت تاثیر قرار گیرد. افزایش سرعت انجام تلقیح لاپاراسکوپی توسط تکنسین حرفه‌ای و با تجربه باعث کاهش طول مدت تلقیح شده و ممکن است تغییر برخی فراسنجه‌ها مانند پروتئین‌های پلاسما نسبت به غلظت پایه آنها از نظر آماری معنی‌دار نشود. در این پژوهش افزایش مشاهده شده در غلظت پروتئین‌های پلاسما ممکن است به علت محتوای آسید آمینه‌ای مکمل مولتی آمینوجکت و تاثیر ویتامین‌ها بر سیستم ایمنی بدن باشد. همسو با این پژوهش هامان و ابوزینا (Hamam & Abou-Zeina, 2007) نشان دادند که استفاده از ویتامین E در گوسفند باعث افزایش سطح گاماگلوبولین‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن می‌گردد.

نتایج تاثیر تزریق اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت بر غلظت پلاسمایی آنزیم اسپارتات آمینوترانسفراز در جدول ۵ نشان داده شده است.

در این پژوهش اثر متقابل تیمار  $\times$  زمان گرایش به معنی داری داشت ( $P = 0/066$ ). غلظت اسپارتات آمینوترانسفراز ۲۰ دقیقه قبل از لاپاراسکوپی تفاوت معنی داری بین شاهد و تیمار دریافت کننده اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت نداشت اما، ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی غلظت اسپارتات آمینوترانسفراز به طور معنی داری در تیمار دریافت کننده اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت کمتر از شاهد بود ( $P < 0/05$ ). افزایش غلظت آنزیم های کراتین کیناز، اسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز در پلازما نشان دهنده آسیب های قلبی و کبدی است. آنزیم اسپارتات آمینوترانسفراز در عضلات قلبی، کبد و عضلات اسکلتی وجود دارد اما، این آنزیم به طور عمده در عضلات قلبی متمرکز است (Han et al., 1995). در مطالعه ای نشان داده شد که در خوک های مینیاتوری چینی تنش منجر به افزایش غلظت پلاسمایی آنزیم اسپارتات آمینوترانسفراز می شود که نشان می دهد این آنزیم می تواند به عنوان شاخص تنش مورد استفاده قرار گیرد (Han et al., 1995). تنش بسته به شدت و نوع آن، باعث آسیب و رها سازی آنزیم های بافتی و کبدی به داخل خون می شود. در پژوهشی نشان داده شد که در اثر تنش حمل و نقل در خوک غلظت پلاسمایی آنزیم اسپارتات آمینوترانسفراز و کراتین کیناز افزایش می یابد اما آلانین آمینو ترانسفراز تغییری نمی کند (Yu et al., 2007). در بره های مقید شده و محروم از آب و خوراک غلظت اسپارتات آمینوترانسفراز ۳۰-۲۰ برابر افزایش یافت (Apple et al., 1993) علاوه بر این، فراسنجه های کبدی و کلیوی ممکن است در پاسخ به تزریق انواع مختلف آرامبخش ها تغییر کنند. نشان داده شده است که تغییر در غلظت آنزیم های AST و ALT پلازما می تواند ناشی از اثرات سمی آرامبخش بر سلول های کبدی و یا تحت تاثیر قرار گرفتن فشار خون کبدی باشد (Dujovne & Zimmerman, 1969) در آزمایشی غلظت AST پلاسمای خرگوش های دریافت کننده کتامین-زایلازین، ۱۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه بعد از تزریق افزایش یافت (Gil et al., 2002). اثرات محافظتی مکمل های ویتامینی و آمینواسیدی در جلوگیری از آسیب های کبدی در مطالعات پیشین گزارش شده است (Raza et al., 2021). در این پژوهش کاهش غلظت AST ۴۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپی در تیمار دریافت کننده اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت ممکن است به اثرات محافظتی ترکیبات ویتامینی و آمینواسیدی موجود در مکمل مولتی آمینوجکت مربوط باشد.

#### توان آنتی اکسیدانی و غلظت مالون دی آلدئید پلازما

نتایج مربوط به اثر تزریق اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت بر توان آنتی اکسیدانی کل پلازما و غلظت مالون دی آلدئید در زمان های خارج سازی اسفنج، ۲۰ دقیقه قبل و ۴۰ دقیقه بعد از لاپاراسکوپی و همچنین ۳ روز پس از آن در جدول ۶ نشان داده شده است. سه روز بعد از لاپاراسکوپی غلظت مالون دی آلدئید پلازما افزایش و توان آنتی اکسیدانی کل در هر دو تیمار کاهش یافت ( $P < 0/05$ ). تزریق اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت توان آنتی اکسیدانی کل پلازما و غلظت مالون دی آلدئید را تحت تاثیر قرار نداد و همچنین اثر متقابل تیمار  $\times$  در زمان نیز معنی دار نبود. جراحی لاپاراسکوپی از طریق تحریک واکنش های التهابی و آندوکرینی، منجر به تنش اکسیداتیو می شود که به نوبه خود ممکن است باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدها، ایجاد التهاب و چسبندگی پریتونیم گردد (Laher, 2014). همسو با نتایج بدست آمده در این پژوهش، Önder و همکاران (Önder et al., 2023) نشان دادند که در گوسفند در برنامه های تلقیح مصنوعی و انتقال جنین از طریق سرویکس، تلاش برای عبور دادن ابزارهای کمک تولیدمثلی از دهانه رحم باعث افزایش غلظت کورتیزول خون و کاهش توان



آنتی اکسیدانی می‌گردد. همچنین برخی از مطالعات انسانی نشان داده‌اند که، جراحی لاپاراسکوپی باعث افزایش رادیکال‌های آزاد و مواد واکنش دهنده با تیوباریتوریک اسید (TBARS) می‌شود (Laher, 2014). رهیافت استفاده از انواع مختلف آنتی‌اکسیدان‌ها قبل از جراحی لاپاراسکوپی برای جلوگیری از بروز تنش اکسیداتیو در برخی مطالعات پیشنهاد شده است (Yiannakopoulou *et al.*, 2013). در مطالعه‌ای استفاده از مکمل‌های حاوی انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی موثر بر سیستم

**جدول ۶-** تنش ناشی از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی (LAI) و اثر پیش تیمار آسپرومازین به همراه یک مکمل حاوی اسیدهای آمینه و ویتامین (مولتی آمینوجکت) بر توان آنتی اکسیدانی کل و غلظت مالودی آلدئید پلاسما قبل و بعد از لاپاراسکوپی در گوسفندان نژاد افشار<sup>۱</sup>.

**Table 6-** Laparoscopic AI associated stress and the pretreatment effect of Acepromazine combined with multivitamin and amino acids (Multiaminoject) on antioxidant status in before and after AI in Afshar ewes

فراسنجه‌ها Parameters	توان آنتی اکسیدانی کل (بر حسب میکرومولار در میلی‌لیتر) Total antioxidant capacity ( $\mu\text{mol/ml}$ )	مالون دی آلدئید (بر حسب میکرومولار در میلی‌لیتر) Malondialdehyde ( $\mu\text{mol/ml}$ )
<b>تیمارها Treatments</b>		
Control	241.43	1.41
ACM <sup>2</sup>	253.15	1.35
SEM	8.025	0.062
<b>Time</b>		
Day of Sponge withdrawal	228.49 <sup>b</sup>	1.29 <sup>b</sup>
20 min before laparoscopy	272.85 <sup>a</sup>	1.26 <sup>b</sup>
40 min after laparoscopy	256.61 <sup>ab</sup>	1.38 <sup>ab</sup>
3 days after laparoscopy	233.02 <sup>b</sup>	1.64 <sup>a</sup>
SEM	10.95	0.085
<b>P-value</b>		
Treat	0.3064	0.4921
Time	0.0265	0.0016
Treat $\times$ Time	0.9553	0.2122

۱- SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها است. حروف متفاوت در داخل هر ستون در هر بخش تفاوت معنی‌دار را بین تیمارها نشان می‌دهد ( $P < 0.05$ ). ACM: آسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت.

2- SEM: standard error of means. Different letters in each column of each part indicate significant difference between groups ( $P < 0.05$ ). ACM: Acepromazine combined with Multi Aminoject.

آنتی‌اکسیدانی، یک هفته قبل و یک هفته بعد از جراحی لاپاراسکوپی باعث بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی پس از جراحی در بیماران شد و سطح TBARS پلاسما بطور معنی‌داری کاهش یافت (Laher, 2014). علت عدم مشاهده اثر معنی‌دار بر فراسنجه‌های آنتی اکسیدانی در این پژوهش ممکن است نوع مکمل حاوی آنتی‌اکسیدان و زمان استفاده از آن قبل و بعد از جراحی باشد.

#### نرخ آبستنی

نتایج مربوط به اثر تزریق آسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت بر نرخ آبستنی در ۴۵ روزگی در جدول ۷ نشان داده شده است. میزان آبستنی در ۴۵ روزگی بین تیمارها تفاوتی نداشت و تزریق آسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت تغییری در نرخ آبستنی ایجاد نکرد. هنگام تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی معمولاً استفاده از دو دسته دارو برای تسکین بخشی توصیه

شده است. دسته اول آلفا-۲ آگونیست‌ها (مانند زایلازین، ۰/۰۵ تا ۰/۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و دسته دوم آرامبخش‌ها (مانند اسپرومازین، ۰/۰۵ تا ۰/۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) پیشنهاد شده است (Sathe, 2018). استفاده از برخی از آرامبخش‌ها و آگونیست‌های آلفا-۲ ممکن است از نظر فیزیولوژیک در برخی از فرایندهای تولیدمثلی مداخله نماید (GibbsIII & Troedsson, 1995; Sciorsci *et al.*, 2018). نشان داده شده است که تزریق زایلازین در اسب‌هایی که دچار آتونی (atony) عضلانی رحم بودند، باعث افزایش انقباضات تتانیک میومتریوم می‌گردد اما تزریق اسپرومازین تاثیری بر انقباضات رحمی ندارد (De Lille *et al.*, 2000). در مورد تاثیر تزریق انواع مختلف آرامبخش‌ها هنگام تلقیح مصنوعی بر نرخ آبستنی و باروری مستندات علمی کافی وجود ندارد. با این وجود باتوجه به اینکه انقباضات رحمی در زمان نزدیک به لقاح نقش مهمی در انتقال تخمک و اسپرم به محل لقاح دارند، ممکن است نوع آرامبخش در زمان تلقیح، نرخ لقاح و آبستنی را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج نرخ آبستنی در پژوهش حاضر نشان داد که تزریق اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت تاثیر منفی بر نرخ آبستنی ندارد که این نتیجه احتمالاً ناشی از عدم تداخل و یا تداخل جزئی اسپرومازین با انقباضات رحمی در حوالی تخمک‌ریزی و لقاح است.

**جدول ۷-۷** تنش ناشی از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپ (LAI) و اثر پیش‌تیمار اسپرومازین به همراه یک مکمل حاوی اسیدهای آمینه و ویتامین بر نرخ آبستنی<sup>۱</sup>.

**Table 7-** Laparoscopic AI associated stress and the pretreatment effect of Acepromazine combined with multivitamin and amino acids complex (Multi Aminoject) on pregnancy rate<sup>1</sup>.

آیتم Item	Control	ACM <sup>2</sup>	P-value
تعداد میش‌های تلقیح شده Number of inseminated ewes	20	20	
تعداد میش‌های آبستن در سونوی ۴۵ روزگی Number of pregnant ewes on d-45	9	10	
درصد آبستنی در ۴۵ روزگی Percentage of pregnancy on d-45	45.00	50.00	0.7515

۱- ACM: اسپرومازین به همراه مولتی آمینوجکت

۱ACM: Acepromazine combined with Multi Aminoject.

### نتیجه‌گیری کلی

عملیات تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپ باعث القاء تنش به گوسفندان شد بطوریکه ۲۰ دقیقه پس از لاپاراسکوپ غلظت کورتیزول بطور معنی‌داری نسبت به غلظت پایه افزایش یافت. متعاقب پاسخ کورتیزول، برخی از فراسنجه‌های خونی تحت تاثیر قرار گرفت. بطوریکه پس از لاپاراسکوپ تعداد گلبول‌های سفید خونی و غلظت مالون دی‌آلدهید پلاسما افزایش و در هماتوکریت، هموگلوبین و توان آنتی‌اکسیدانی کل کاهش یافت اما، غلظت پروتئین‌های پلاسما تحت تاثیر قرار نگرفت. تزریق مولتی آمینوجکت و اسپرومازین باعث افزایش پروتئین‌های پلاسما و کاهش سطح آنزیم اسپاراتات آمینوترانسفراز گردید گردید اما، میزان آبستنی در ۴۵ روزگی را تحت تاثیر قرار نداد. بطور کلی هنگام تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپ نیازی به استفاده از آرامبخش به همراه مولتی آمینوجکت نیست و استفاده از آن ممکن است باعث افزایش هزینه‌های تلقیح و تحمیل استرس اضافی به حیوان گردد و بجای آن افزایش سرعت هر تلقیح با بهره‌گیری از تکنسین با تجربه پیشنهاد می‌شود.

- Aghamiri, S. M., Samimi, A. S., Hajian, M., Samimi, A. M., & Oroumieh, A. (2022). Effect of xylazine, detomidine, medetomidine and dexmedetomidine during laparoscopic SCNT embryo transfer on pregnancy rate and some physiological variables in goats. *BMC Veterinary Research*, 18(1), 98. [10.1186/s12917-022-03194-8](https://doi.org/10.1186/s12917-022-03194-8)
- Ali, B., Al-Qarawi, A., & Mousa, H. (2006). Stress associated with road transportation in desert sheep and goats, and the effect of pretreatment with xylazine or sodium betaine. *Research in Veterinary Science*, 80(3), 343-348. [10.1016/j.rvsc.2005.07.012](https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2005.07.012)
- Ali, B. H., & Al-Qarawi, A. (2002). Evaluation of drugs used in the control of stressful stimuli in domestic animals: a review. *Acta Veterinaria Brno*, 71(2), 205-216.
- Apple, J., Minton, J., Parsons, K., & Unruh, J. (1993). Influence of repeated restraint and isolation stress and electrolyte administration on pituitary-adrenal secretions, electrolytes, and other blood constituents of sheep. *Journal of animal science*, 71(1), 71-77. [10.2527/1993.71171x](https://doi.org/10.2527/1993.71171x)
- Arfuso, F., Fazio, F., Chikhi, L., Aymond, G., Piccione, G., & Giannetto, C. (2022). Acute stress response of sheep to shearing procedures: Dynamic change of cortisol concentration and protein electrophoretic pattern. *Animals*, 12(7), 862. [10.3390/ani12070862](https://doi.org/10.3390/ani12070862)
- Arfuso, F., Rizzo, M., Giannetto, C., Giudice, E., Piccione, G., Fazio, F., Cirincione, R., Cassata, G., & Cicero, L. (2023). Inflammatory-like status and acute stress response in horses after road transport. *Scientific Reports*, 13(1), 9858. [10.1038/s41598-023-37069-1](https://doi.org/10.1038/s41598-023-37069-1)
- Avila-Jaime, B., Ramos-Zayas, Y., Franco-Molina, M. A., Alvarado-Avila, R., Zamora-Avila, D. E., Fimbres-Durazo, H., Zárate-Ramos, J. J., & Kawas, J. R. (2021). Effects of Transportation Stress on Complete Blood Count, Blood Chemistry, and Cytokine Gene Expression in Heifers. *Veterinary Sciences*, 8(10), 231.
- Ballou, M., Sutherland, M., Brooks, T., Hulbert, L., Davis, B., & Cobb, C. (2013). Administration of anesthetic and analgesic prevent the suppression of many leukocyte responses following surgical castration and physical dehorning. *Veterinary immunology and immunopathology*, 151(3-4), 285-293. [10.1016/j.vetimm.2012.11.018](https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2012.11.018)
- Brearley, J., Dobson, H., & Jones, R. (1990). Investigations into the effect of two sedatives on the stress response in cattle. *Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics*, 13(4), 367-377. [10.1111/j.1365-2885.1990.tb00791.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2885.1990.tb00791.x)
- Damián, J., & Ungerfeld, R. (2011). The stress response of frequently electroejaculated rams to electroejaculation: hormonal, physiological, biochemical, haematological and behavioural parameters. *Reproduction in domestic animals*, 46(4), 646-650. [10.1111/j.1439-0531.2010.01722.x](https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2010.01722.x)
- Danyer, E., Bilal, T., Altiner, A., Aytakin, İ., & Atalay, H. (2021). The effect of vitamin E treatment on selected immune and oxidative parameters in Kivircik ewes suffering from transport stress. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 105, 34-41. [10.1111/jpn.13560](https://doi.org/10.1111/jpn.13560)
- De Leon, J. A. D., & Borges, C. R. (2020). Evaluation of oxidative stress in biological samples using the thiobarbituric acid reactive substances assay. *JoVE (Journal of Visualized Experiments)*(159), e61122. <https://doi.org/10.3791/61122>
- De Lille, A., Silvers, M., Cadario, M., Tran, T., Cage, C., & LeBlanc, M. (2000). Interactions of xylazine and acepromazine with oxytocin and the effects of these interactions on

- intrauterine pressure in normal mares and mares with delayed uterine clearance. *Journal of Reproduction and fertility. Supplement*(56), 373-379.
- Dujovne, C. A., & Zimmerman, H. J. (1969). Cytotoxicity of phenothiazines on Chang liver cells as measured by enzyme leakage. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine*, 131(2), 583-587. [10.3181/00379727-131-33931](https://doi.org/10.3181/00379727-131-33931)
- Fierro, S., Olivera-Muzante, J., Gil, J., & Viñoles, C. (2011). Effects of prostaglandin administration on ovarian follicular dynamics, conception, prolificacy, and fecundity in sheep. *Theriogenology*, 76(4), 630-639. [10.1016/j.theriogenology.2011.03.016](https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2011.03.016)
- GibbsIII, H. M., & Troedsson, M. H. (1995). Effect of acepromazine, detomidine, and xylazine on myometrial activity in the mare. *Biology of Reproduction*, 52(monograph\_series1), 489-493. [10.1093/biolreprod/52.monograph\\_series1.489](https://doi.org/10.1093/biolreprod/52.monograph_series1.489)
- Gil, A. G., Illera, J. C., Silván, G., Lorenzo, P. L., & Illera, M. (2002). Changes in hepatic and renal enzyme concentrations and heart and respiratory rates in new zealand white rabbits after anesthetic treatments. *Journal of the American Association for Laboratory Animal Science*, 41(6), 30-32.
- Grandin, T. (2021). How to improve livestock handling and reduce stress. *Improving animal welfare: a practical approach*(Ed. 3), 84-112.
- Hamam, A., & Abou-Zeina, H. (2007). Effect of vitamin E and selenium supplements on the antioxidant markers and immune status in sheep. *J. Biol. Sci*, 7(6), 870-878. <https://doi.org/10.3923/jbs.2007.870.878>
- Han, B., Gao, D., & Wang, Q. (1995). Study on the mechanism of coniril high temperature transport stress in china experimental miniature pig with supplement compound sodium chlobide power. *Acta Vet Zootech Sinica*, 26, 261-267.
- Hoffman, J. R., Ratamess, N. A., Ross, R., Shanklin, M., Kang, J., & Faigenbaum, A. D. (2008). Effect of a pre-exercise energy supplement on the acute hormonal response to resistance exercise. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 22(3), 874-882. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31816d5db6>
- Hsieh, C., & Rajashekaraiyah, V. (2021). Ferric reducing ability of plasma: a potential oxidative stress marker in stored plasma. *Acta Haematologica Polonica*, 52(1), 61-67. <https://doi.org/10.5603/AHP.2021.0009>
- Jobgen, W., Meininger, C. J., Jobgen, S. C., Li, P., Lee, M.-J., Smith, S. B., Spencer, T. E., Fried, S. K., & Wu, G. (2009). Dietary L-arginine supplementation reduces white fat gain and enhances skeletal muscle and brown fat masses in diet-induced obese rats. *The Journal of nutrition*, 139(2), 230-237. [10.3945/jn.108.096362](https://doi.org/10.3945/jn.108.096362)
- Kiyma, Z., Alexander, B., Van Kirk, E., Murdoch, W., Hallford, D., & Moss, G. (2004). Effects of feed restriction on reproductive and metabolic hormones in ewes. *Journal of animal science*, 82(9), 2548-2557. [10.2527/2004.8292548x](https://doi.org/10.2527/2004.8292548x)
- Laher, I. (2014). *Systems biology of free radicals and antioxidants* (First ed.). Springer.
- Lone, F. (2022). Artificial insemination in sheep-a breakthrough in offing. *Applied Veterinary Research*, 1(1), e2022001-e2022001. [10.31893/avr.2022001](https://doi.org/10.31893/avr.2022001)
- McKnight, J. R., Satterfield, M. C., Jobgen, W. S., Smith, S. B., Spencer, T. E., Meininger, C. J., McNeal, C. J., & Wu, G. (2010). Beneficial effects of L-arginine on reducing obesity: potential mechanisms and important implications for human health. *Amino acids*, 39, 349-357. [10.1007/s00726-010-0598-z](https://doi.org/10.1007/s00726-010-0598-z)

- Nayyar, S., & Jindal, R. (2010). Essentiality of antioxidant vitamins for ruminants in relation to stress and reproduction. *Iranian Journal of Veterinary Research*, 11(1), 1-9.
- Önder, N. T., Batı, Y. U., Gökdemir, T., Kılıç, M. C., Şahin, O., Ögün, M., Akyüz, E., Kuru, M., Kırmızıgül, A. H., & Yıldız, S. (2023). Oxidative response of sheep to transcervical applications. *Reproduction in domestic animals*. [10.1111/rda.14361](https://doi.org/10.1111/rda.14361)
- Parker, A., Hamlin, G., Coleman, C., & Fitzpatrick, L. (2004). Excess cortisol interferes with a principal mechanism of resistance to dehydration in *Bos indicus* steers. *Journal of animal science*, 82(4), 1037-1045. [10.2527/2004.8241037x](https://doi.org/10.2527/2004.8241037x)
- Priskas, S., Valergakis, G., Tsakmakidis, I., Vouraki, S., Papanikolopoulou, V., Theodoridis, A., & Arsenos, G. (2022). The Role of Housing Conditions on the Success of Artificial Insemination in Intensively Reared Dairy Ewes in Greece. *Animals*, 12(19), 2693. [10.3390/ani12192693](https://doi.org/10.3390/ani12192693)
- Raza, S., Tewari, A., Rajak, S., & Sinha, R. A. (2021). Vitamins and non-alcoholic fatty liver disease: a molecular insight. *Liver research*, 5(2), 62-71. [10.1016/j.livres.2021.03.004](https://doi.org/10.1016/j.livres.2021.03.004)
- Sathe, S. R. (2018). Laparoscopic Artificial Insemination Technique in Small Ruminants—A Procedure Review. *Frontiers in veterinary science*, 5, 266. [10.3389/fvets.2018.00266](https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00266)
- Sciorsci, R., Piccinno, M., & Rizzo, A. (2018). Scopolamine butylbromide decreases the xylazine-mediated contractility in bovine pregnant uteri. *Theriogenology*, 108, 348-353. [10.1016/j.theriogenology.2017.12.033](https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2017.12.033)
- Small, A., Fisher, A. D., Lee, C., & Colditz, I. (2021). Analgesia for sheep in commercial production: Where to next? *Animals*, 11(4), 1127. [10.3390/ani11041127](https://doi.org/10.3390/ani11041127)
- Stafford, K., Chambers, J., Sylvester, S., Kenyon, P., Morris, S., Lizarraga, I., & de Nicolo, G. (2006). Stress caused by laparoscopy in sheep and its alleviation. *New Zealand Veterinary Journal*, 54(3), 109-113. [10.1080/00480169.2006.36621](https://doi.org/10.1080/00480169.2006.36621)
- Tsuda, Y., Murakami, R., Yamaguchi, M., & Seki, T. (2020). Acute supplementation with an amino acid mixture suppressed the exercise-induced cortisol response in recreationally active healthy volunteers: a randomized, double-blinded, placebo-controlled crossover study. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 17(1), 39. [10.1186/s12970-020-00369-2](https://doi.org/10.1186/s12970-020-00369-2)
- Yardimci, M., Sahin, E., Cetingul, I., Bayram, I., Aslan, R., & Sengor, E. (2013). Stress responses to comparative handling procedures in sheep. *Animal*, 7(1), 143-150. [10.1017/S1751731112001449](https://doi.org/10.1017/S1751731112001449)
- Yiannakopoulou, E. C., Nikiteas, N., Perrea, D., & Tsigris, C. (2013). Effect of laparoscopic surgery on oxidative stress response: systematic review. *Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques*, 23(2), 101-108. <https://doi.org/10.1097/SLE.0b013e3182827b33>
- Yu, H., Bao, E. D., Zhao, R. Q., & Lv, Q. X. (2007). Effect of transportation stress on heat shock protein 70 concentration and mRNA expression in heart and kidney tissues and serum enzyme activities and hormone concentrations of pigs. *American Journal of Veterinary Research*, 68(11), 1145-1150. [10.2460/ajvr.68.11.1145](https://doi.org/10.2460/ajvr.68.11.1145)