



The Effect of Using Different Fat Sources in Close-Up Diets on the Feed Consumption, Blood Parameters, Body Measurements and Performance of Holstein Dairy Calves

Mahmood Reza Amini¹, Abbasali Naserian^{1,2*}, Reza Valizade², Essa Dirande³

Received: 19-07-2022

Revised: 09-10-2022

Accepted: 13-11-2022

Available Online: 13-11-2022

How to cite this article:

Amini, M., Naserian, A., Valizade, R., & Dirande, E. (2023). The effect of using different fat sources in close-up diets on the feed consumption, blood parameters, body measurements and performance of Holstein dairy calves. *Iranian Journal of Animal Science Research*, 15(3), 317-331.

DOI: [10.22067/ijasr.2022.77719.1089](https://doi.org/10.22067/ijasr.2022.77719.1089)

Introduction: Raising healthy calves is indeed a critical concern in the dairy industry. Close up diets have important effects on the quantity and quality of produced colostrum, on the other hand, colostrum and milk are considered the most important sources of food that contain energy, protein, and other nutrients for the newborn calf's growth. Including fatty acids in the late pregnancy supplements are controversial because of the potential reduction of cows DMI. Also, the growth and health of calves can be influenced by feeding linoleic acid to pregnant cows. Safflower as a rich source of linoleic acid (55-70%) is a significant oil alternative product, and has a high nutritional value. This study aimed to examine the effects of safflower seeds and palmitic fatty acids on the transition diet in cow feed consumption, colostrum quality, blood parameters, body measurements and Holstein calf performance.

Materials and Methods: Thirty pregnant Holstein cows, 15 primiparous and 15 multiparous, were used 21 days prior to the expected calving date. The experiment was conducted using a completely randomized experimental design with three treatments and ten replicates in every treatment. Cows were randomly assigned to experimental treatments so that each treatment have an average body weight 659.34 ± 84.2 kg, parity 2.04 ± 1.31 and body condition score (BCS) 3.23 ± 0.15 . The experimental rations have similar energy and protein content. Diets were thoroughly mixed and fed to cows based on the recommendations of the US National Research Council (NRC, 2001). The experimental rations included: 1) Control diet without fat source (Ctrl), 2) Diet with palmitic fatty acid (SFA), and 3) Diet with safflower seed (UFA). Daily feed intake was calculated by subtracting distributed feed to every cow from the leftover amount on following day. Newborn calves were weighed immediately after birth. An individual colostrum yield for every cow was recorded at each milking. The quality of colostrum was determined using an optical refractometer (ATC., China). The body weight and skeletal parameters of calves were evaluated at birth day, 21 d, and 49 d. Blood samples were taken immediately after birth, two hours after colostrum feeding and on days 3, 7, 21, and 49 via the jugular vein. Samples were centrifuged at $3000 \times g$ and the plasma was stored at -20°C until analysis. Plasma metabolites were analyzed using an autoanalyzer (Alcyon 300., USA). Colostrum composition (fat, protein, lactose, solids, solids not fat) was determined using a Milkoscan (Foss Electric, Hillerød, Denmark). Fatty acids profile were measured according to O'Fallon (2007) et al., using gas chromatography (GC) equipped FID detector and 100 meter column. Data were analyzed using the MIXED procedure of SAS using a completely randomized design with ten replications.

1- Ph.D Animal Nutrition, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2- Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3- Associate Professor, Animal Science Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.

*Corresponding Author's Email: Abbasalin@yahoo.com

Results and Discussion: Using sources of SFA (palm oil powder) and UFA (safflower seeds) in the transition diets were not affected on dry matter intake in Holstein dairy cows ($P>0.05$). Dry matter intake in Ctrl, SFA, and UFA were 10.29, 10.98, and 10.80 kg per day, respectively. We found that using SFA and UFA did not have any significant effect on colostrum parameters such as colostrum volume, the percentage of fat, protein, lactose, total solids, fat not solids, and also, immunoglobulin concentration, and Brix number of colostrum ($P>0.05$). The colostrum volume in UFA and SFA treatments was higher than in the Ctrl treatment, but this difference was not significant (5.82, 5.23, and 4.19 kg, respectively). According to the results, the researchers stated that adding raw and processed safflower seeds to the diet did not have any significant effect on milk production, milk fat, protein, and lactose in Holstein dairy cows (Paya and Taghizadeh, 2020). Feeding omega-6 sources in the transition period (35 days before calving) caused higher colostrum protein and Brix values (Salehi et al., 2016) but was not consistent with our results. Feeding palm fat powder as a source of SFA and safflower seeds as UFA did not have any significant differences in concentration of short chain, medium chain, and long chain fatty acids in colostrum. It was reported that various fat sources in the rations of dairy and transition cows did not affect colostrum fatty acid and milk fatty acid. However some studies showed that different fat sources in the diet of dairy cows changed the fatty acid profile in milk. In general, it can be stated that because of the high-producing dairy cows experience a negative energy around calving, the diet energy meets the requirements, which probably causes the fatty acid composition of the colostrum not to be affected. Our results showed that blood factors such as glucose, cholesterol, triglycerides, blood urea nitrogen, ALT, AST, total antioxidant capacity, malondialdehyde, total protein, albumin, calcium, magnesium, phosphorus, and HDL did not differ between treatments. It was observed that the addition of SFA and UFA had no significant effect on the birth weight of calves, weight at d 21 and 49, and dry matter intake during the experimental period. Skeletal parameters such as hip height and width, withers height, chest circumference, and body length at 3, 21, and 49 days had no significant differences in the treatments.

Conclusion: It seems that using saturated and unsaturated fatty acids sources in the transition diets did not reduce feed intake. Moreover, it had no significant influence on the calves' performance, bone condition, the colostrum's quality and the colostrum fatty acids profile.

Keywords: Performance, Holstein dairy calf, Saturated fatty acid, Unsaturated fatty acid

اثر منابع مختلف چربی در جیره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، فراسنجه‌های خونی، اندازه‌های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

محمودرضا امینی^۱، عباسعلی ناصریان^{۲*}، رضا ولی‌زاده^۲، عیسی دیرنده^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، اثر افزودن منابع مختلف چربی (اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع) در جیره انتظار زایش گاوهای هلشتاین بر مصرف خوراک، فراسنجه‌های خونی، اندازه‌های بدنی و عملکرد گوساله‌ها پس از تولد می‌باشد. در این پژوهش از ۳۰ راس گاو شیری هلشتاین نزدیک زایش (۱۵ راس شکم اول و ۱۵ راس چند شکم زایش، میانگین نمره وضعیت بدنی $۳/۳۲ \pm ۰/۱۵$ و میانگین وزن بدن $۸۴/۲ \pm ۶۵۹/۳۴$ کیلوگرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و ۱۰ تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱- گروه کنترل (بدون چربی) ۲- گروه اسید چرب اشباع (پالمیتیک اسید) ۳- گروه اسید چرب غیراشباع (دانه گلرنگ) بودند. تغذیه از ۲۱ روز مانده به تاریخ احتمالی زایش تا زمان زایش ادامه یافت. ماده خشک مصرفی به صورت روزانه اندازه‌گیری شد. گاوها پس از زایمان توسط دستگاه شیردوش انفرادی دوشیده شده و حجم آغوز آن‌ها ثبت شد، همچنین جهت بررسی کیفیت آغوز دو نمونه از آن مورد ارزیابی قرار گرفت. خون‌گیری از گوساله‌های تازه متولد شده در زمان‌های تولد (قبل از مصرف آغوز)، دو ساعت پس از مصرف آغوز، ۳، ۷، ۲۱ و ۴۹ روز پس از تولد از گوساله‌ها انجام شد. وزن گوساله‌ها و اندازه‌های بدنی در زمان‌های تولد، ۲۱ و ۴۹ روزگی اندازه‌گیری شدند. به‌طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر ماده خشک مصرفی قبل از زایش گاوها تأثیر معنی‌داری نداشت، همچنین تیمارهای آزمایشی بر کیفیت آغوز، اسیدهای چرب آغوز، فراسنجه‌های خونی، اندازه‌های بدنی و عملکرد گوساله‌های هلشتاین تأثیر معنی‌داری نداشتند.

واژه‌های کلیدی: اسید چرب اشباع، اسید چرب غیراشباع، عملکرد، گوساله هلشتاین

مقدمه

پرورش گوساله‌های شیرخوار می‌باشد. طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده است که تغذیه گاوها در دوره نزدیک زایش می‌تواند بر کیفیت و حجم آغوز تولیدی مؤثر باشد. تأثیر گنجانیدن مکمل‌های چربی و اسید چرب در اواخر دوره آبستنی به دلیل کاهش بالقوه ماده خشک مصرفی بحث‌برانگیز است (Garcia et al., 2014). تغذیه

گوساله‌ها در طول دوره پیش از شیرگیری بسیار مهم است (Terler et al., 2022); زیرا مدیریت و تغذیه مناسب و صحیح گوساله‌های شیرخوار تأثیر بسزایی بر سلامت گوساله‌های شیری و بهره‌وری کلی گله در آینده دارد (Blakely et al., 2019) و آینده تولیدی گله را به شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، در چند هفته نخست زندگی گوساله‌ها به دلیل توسعه نیافتن شکمبه، گوساله‌ها به مقدار کافی نمی‌توانند خوراک جامد مصرف کنند، در نتیجه شیر (آغوز)

یکی از درآمدهای مهم در گله‌های گاو شیری، پرورش گوساله‌های سالم می‌باشد. از این رو، تغذیه گوساله‌ها در ساعات ابتدایی تولد همراه با آغوز باکیفیت یکی از مهم‌ترین نکات مدیریتی

۱- دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

۲- استاد تغذیه دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

۳- دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

(Email: Abbasalin@yahoo.com)

*- نویسنده مسئول:

DOI: 10.22067/ijasr.2022.77719.1089

تکرار استفاده شد. در گروه‌های آزمایشی گاوهای استفاده شده از نظر فردی و ویژگی‌های تولیدی و تولیدمثلی، شکم زایش ($1/31 \pm 2/04$)، وزن بدن ($2/84 \pm 659/33$ کیلوگرم) و اسکور بدنی ($1/15 \pm 3/23$) تقریباً شبیه بودند و به صورت تصادفی در جایگاه‌های اختصاصی و انفرادی مستقر شدند و سپس جیره‌های آزمایشی به طور کاملاً مخلوط و با انرژی و پروتئین نسبتاً مشابه، بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقات آمریکا (NRC, 2001) در اختیار گاوها قرار داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱- گروه کنترل (بدون چربی) ۲- گروه اسید چرب اشباع پالمیتیک اسید (رومی فت) ۳- گروه اسید چرب غیراشباع (دانه گلرنگ) بودند. قابل ذکر است که میزان استفاده از چربی پالم ۱/۴ درصد ماده خشک و استفاده از دانه گلرنگ آسیاب شده ۵ درصد ماده خشک بود که دانه گلرنگ مورد استفاده در این آزمایش از واریته گلدشت بود. اجزا و ترکیبات خوراک در جدول یک گزارش شده است. قابل ذکر است که مدت زمان استفاده از جیره‌ها از ۲۱ روز مانده به تاریخ احتمالی زایش تا زمان زایش بود.

اندازه‌گیری‌ها

مصرف ماده خشک گاوها

گاوها در جایگاه انفرادی نگه داری می‌شدند و خوراک در دو وعده صبح و بعدازظهر در اختیارشان قرار داده شد، به صورتی که بین ۳-۵ درصد خوراک به صورت هوا خشک در آخور باقی بماند. خوراک به صورت روزانه وزن کشی و باقی‌مانده آخور هم قبل از خوراک‌ریزی روز بعد اندازه‌گیری شد. جهت اندازه‌گیری ماده خشک از خوراک روزانه نمونه‌گیری انجام پذیرفت.

وزن‌کشی، خوراندن آغوز، شیر و استارت

گوساله‌های متولد شده بلافاصله پس از زایمان وزن‌کشی شده و بند ناف آن‌ها با محلول تئورید ضدعفونی و سپس به جایگاه‌های انفرادی در گوساله‌دانی انتقال داده شدند. گاوها پس از زایمان توسط دستگاه شیردوش انفرادی با رعایت اصول بهداشتی دوشیده شده، حجم آغوز آن‌ها ثبت و آغوز هر گاو به گوساله خودش خوراندند. همچنین جهت بررسی کیفیت آغوز دو نمونه از آن را در دماهای چهار درجه سانتی‌گراد و ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شدند. قابل ذکر است کیفیت مزرعه‌ای آغوز با استفاده از رفرکتومتر چشمی با واحد بریکس در گاوداری مورد بررسی قرار گرفت. قبل از خوراندن آغوز اولین خون‌گیری از گوساله‌ها از ورید گردن صورت گرفت و پس از خون‌گیری، آغوز به مقدار ۱۲ درصد وزن بدن در طی ۲۴ ساعت به گوساله‌ها خوراندند، به طوری که دو لیتر آغوز در یک ساعت اول تولد داده شد. استارت یکسان برای گوساله‌ها از هفته دوم تولد در اختیارشان قرار داده شد. خوراندن شیر به گوساله‌ها به مقدار ۱۰ درصد وزن بدن و در دو وعده صبح و عصر صورت پذیرفت. وزن گوساله‌ها و اندازه‌های بدنی در زمان‌های تولد، ۲۱ و ۴۹ روزگی اندازه‌گیری شدند.

به‌عنوان مهم‌ترین منبع غذایی که دارای انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی برای گوساله‌ها هست، مورد توجه قرار دارد (Delir et al., 2020). در میان عوامل تأثیرگذار در تولید شیر و تغذیه گاو، مکمل‌های چربی، اهرم اصلی برای بهبود محتوای انرژی جیره نشخوارکنندگان و ترکیب چربی شیر است (Bernard et al., 2020). به‌منظور بهبود محتوای اسیدهای چرب غیراشباع چربی شیر، برخی از دانه‌های روغنی به جیره نشخوارکنندگان اضافه می‌شوند (Oyebade et al., 2020). در یک طبقه‌بندی، اسیدهای چرب را می‌توان به اسیدهای چرب اشباع یا غیراشباع تقسیم‌بندی نمود و آن‌ها از نظر طول زنجیره متفاوت هستند و اغلب به‌عنوان اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه، متوسط یا بلند طبقه‌بندی می‌شوند. تغذیه اسیدهای چرب امگا ۶ و امگا ۳ به گاو می‌تواند رشد و فرآیندهای متابولیک را در گوساله‌ها تعدیل کند (Abuelo, 2020). در گزارشی مشخص گردید که افزودن اسیدهای چرب اشباع و همچنین منابع اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ۶ در جیره انتظار زایش می‌تواند بر غلظت ایمنوگلوبین G، ترکیب اسیدهای چرب آغوز و پلاسما خون گوساله‌های متولد شده مؤثر باشد (Garsia et al., 2014). گلرنگ (*Carthamus tinctorius*) یک گیاه روغنی یک ساله از خانواده Asteraceae است (Yao et al., 2018)؛ که شامل ۸-۱۳٪ درصد پروتئین خام، ۳۹-۴۲ درصد فیبر شوبنده خنثی، ۶/۶۷-۴/۷۵ درصد لیگنین، ۰/۷-۰/۴ درصد تانن و ۲۰۴۰ کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم ماده خشک برای نشخوارکنندگان است (Cagri and Kara, 2018; Asgharzadeh et al., 2013)؛ و محتوای روغن زیاد (۳۲-۲۷ درصد) که سرشار از اسید لینولئیک (۵۵-۷۰ درصد) است، یک محصول جایگزین مهم روغنی است و به دلیل مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فعال زیستی و اسیدهای چرب ضروری از ارزش غذایی و دارویی بالایی برخوردار است (Ergonul and Ozbek, 2020)؛ تحقیقات نشان داده است که می‌توان دانه گلرنگ را به جیره نشخوارکنندگان اضافه کرد (Alizadeh et al., 2010). بنابراین، هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع (دانه گلرنگ) و اشباع در جیره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، کیفیت آغوز، فراسنجه‌های خونی، اندازه‌های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیری هلشتاین بعد از زایمان می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در مرکز تحقیقات گاو شیری دانشگاه فردوسی مشهد در استان خراسان رضوی از اردیبهشت تا شهریور ماه سال ۱۳۹۸ انجام شد. بدین منظور از ۳۰ راس گاو هلشتاین آبستن (شامل ۱۵ راس شکم اول و ۱۵ راس چند شکم زایش) حدود ۲۱ روز قبل از تاریخ احتمالی زایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و ۱۰

جدول ۱- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره‌های انتظار زایش گاوهای هلشتاین (درصد ماده خشک جیره)

Table 1- Ingredients and chemical composition of pre parturition diets of Holstein cows (percentage of dry matter in the diet)

اجزای جیره (درصد ماده خشک) Components of diets (% DM)	تیمارهای آزمایشی Experimental treatments		
	شاهد Control	روغن پالم Palm oil	دانه گلرنگ Safflower seed
یونجه خشک Alfalfa hay	21.22	21.13	21.14
سیلاژ ذرت Corn silage	29.12	29.00	29.01
کاه گندم Wheat straw	10.04	10.00	10.01
دانه جو Barley grain	19.72	18.30	14.68
کنجاله سویا Soyabean meal	4.25	4.23	4.23
کنجاله کلزا Canola meal	4.3	4.72	2.75
پودر گوشت Meat powder	1.79	1.79	1.79
سیوس گندم Wheat bran	8.74	8.63	10.62
پودر چربی پالم Palm base fat	-	1.38	-
دانه گلرنگ Safflower seed	-	-	4.96
کربنات کلسیم Calcium carbonate	0.29	0.28	0.28
مکمل معدنی و ویتامینی ^۱ Vitamin-mineral premix	0.53	0.53	0.53
مکمل ویتامین E+Se Premix E+Se ^۲	0.15	0.15	0.15
ترکیب شیمیایی جیره (درصد ماده خشک) Chemical components of die			
انرژی خالص شیردهی (مگا کالری / کیلوگرم ماده خشک) Net energy for lactation (Mcal/kg)	1.58	1.62	1.6
پروتئین خام Crude protein	13.8	13.8	13.8
کربوهیدرات غیر فیبری Non- fiber carbohydrate	36.5	35.6	33.4
چربی Crude fat	2.8	4.1	4.1
فیبر نامحلول در شوینده خنثی Neutral detergent fiber	42.4	42.0	44
فیبر نامحلول در شوینده اسیدی Acid detergent fiber	26.4	26.3	27.8
کلسیم Calcium	0.7	0.7	0.7
فسفر Phosphorous	0.5	0.5	0.5

^۱ آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی: ویتامین A: 1000000 IU/Kg، ویتامین D: 500000 IU/kg، ویتامین E: 1000 IU/kg، کلسیم: 68679 mg/kg، فسفر: 30000 mg/kg، منیزیم: 30000 mg/kg، Mg 20700 Mg/kg، Na: 40000 mg/kg، Mn 5000 mg/kg، Zinc: 10395 mg/kg، Copper: 1840 mg/kg، Selenium: 100 mg/ kg، Iodine: 120 mg/kg، Cobalt: 100 mg/kg، Antioxidant : 400 mg/kg.

^۲ آنالیز مکمل ویتامین E + Se: ویتامین E: 11000 mg/kg، Selenium 300 mg/kg، Antioxidant: 400 mg/kg.

^۳ انرژی خالص شیردهی بر اساس مصرف ماده خشک ۱۱/۵ کیلو گرم در روز و با استفاده از نرم افزار NRC (۲۰۰۱) محاسبه شده است.

^۱ Vitamin and mineral supplement analysis: Vitamin A: 1000000 Iu/kg, vitamin D: 500000 IU/kg, Vitamin E: 1000 IU/kg, Ca: 68679 mg/kg, P: 30000 mg/kg, Mg 20700 Mg/kg, Na: 40000 mg/kg, Mn 5000 mg/kg, Zinc: 10395 mg/kg, Copper: 1840 mg/kg, Selenium: 100 mg/ kg, Iodine: 120 mg/kg, Cobalt: 100 mg/kg, Antioxidant : 400 mg/kg.

^۲ Vitamin E + Selenium supplement analysis: Vitamin E: 11000 mg/kg, Selenium 300 mg/kg, Antioxidant: 400 mg/kg.

^۳ The net energy of lactation was calculated based on the consumption of dry matter of 11.5 kg per day and using NRC (2001) software.

نمونه‌گیری آغوز

خون‌گیری از گوساله‌ها از طریق سیاهرگ و داج گردنی انجام شد و بعد از آن، نمونه‌های خون به‌منظور تهیه سرم با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم آن‌ها جدا شد. سپس سرم‌ها داخل میکروتیوپ‌های دو سی‌سی ریخته شده و در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد تا زمان اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی نگهداری شدند. فراسنجه‌های خونی با استفاده از کیت‌های آزمایشگاهی (شرکت پارس آزمون، ایران) و با استفاده از دستگاه اتوآنالیزر اندازه‌گیری شد.

تجزیه و تحلیل آماری

داده‌های آماری حاصل از این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرم‌افزار SAS 9.4 آنالیز و با استفاده از رویه MIEXED مقایسه شدند. مقایسه میانگین بین تیمارهای آزمایشی در سطح پنج درصد و با استفاده از آزمون توکی انجام شد.

$$Y_{ijk} = \mu + T_i + A(i)j + S_k + TS_{jk} + \varepsilon_{ijk}$$

که در آن، Y_{ijk} : متغیر وابسته، μ : میانگین کل، T_i : اثر تیمار، $A(i)j$: اثر تصادفی حیوان در تیمار، S_k : زمان نمونه‌گیری، TS_{jk} : اثر متقابل تیمار در زمان نمونه‌گیری و ε_{ijk} : آثار باقی‌مانده می‌باشند.

نتایج و بحث

تأثیر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر مصرف ماده خشک در گاوهای هلشتاین در جدول ۲ گزارش شده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده ماده خشک مصرفی قبل از زایش تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$).

جدول ۲- اثر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر مصرف ماده خشک در گاوهای هلشتاین

Table 2- The Effect of using sources of unsaturated and saturated fatty acids in the expectation diet on dry matter intake in Holstein cows

متغیر Parameter	جیره‌های آزمایشی Experimental diets			SEM ¹	سطح احتمال معنی دار شدن P value ²		
	شاهد Control	روغن پالم Palm oil	دانه گلرنگ Safflower seed		Treatment	Time	Treatment×time
ماده خشک مصرفی قبل از زایش (کیلوگرم/روز) Dry matter intake before calving(kg/day)	10.29	10.98	10.80	0.438	0.530	0.123	0.659

¹ میانگین خطای استاندارد

² سطح احتمال معنی دار شدن P=0.05

¹ Standard error of mean

² Probability value p=0/05

مطابق با نتایج این آزمایش، در مطالعه‌ای که به‌منظور بررسی

گزارش کردند که افزودن مکمل‌های تری گلیسیرید و اسید چرب (FA) غنی شده با اسید پالمیتیک در گاوهای هلشتاین تأثیر معنی‌داری بر ماده خشک مصرفی نداشت. در پژوهشی دیگر مشخص شد که افزودن اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع به جیره گاوهای هلشتاین در دوره قبل از زایش تأثیری بر مصرف ماده خشک و تغییرات وزن بدن نداشت (Garcia et al., 2014) دلیل تحت تأثیر قرار نگرفتن ماده خشک مصرفی ممکن است به ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی جیره‌ها مربوط باشد که می‌تواند بر ماده خشک مصرفی تأثیر بگذارد که این ویژگی‌ها شامل محتوای فیبر، سهولت هیدرولیز نشاسته و فیبر، اندازه ذرات، شکنندگی ذرات، محصولات تخمیر سیلو، غلظت و ویژگی‌های چربی، مقدار و تجزیه پروتئین در شکمبه باشد (Allen, 2000).

اثرات استفاده از دانه گلرنگ خام و فراآوری شده در گاوهای هلشتاین چند شکم‌زا صورت گرفت، نتایج نشان داد که دانه گلرنگ تأثیر معنی‌داری بر ماده خشک مصرفی نداشت (Paya and Berthiaume, 2006). همچنین در پژوهش دیگری، اوی باده و همکاران (Oyebade et al., 2020)، گزارش کردند که افزودن روغن پالم به جیره گاوهای هلشتاین پر تولید و چند شکم منطقه مدیترانه بر مصرف ماده خشک تأثیر معنی‌داری نداشت. وانگ و همکاران (Wang et al., 2010) نشان دادند که مکمل اسیدهای چرب اشباع بر ماده خشک مصرفی گاوها تأثیر معنی‌داری نداشت. در پژوهشی دیگر بیان شد که مکمل جیره غذایی با دانه‌های روغنی در گاوهای چند شکم زایش هلشتاین، تأثیر معنی‌داری بر ماده خشک مصرفی گاوها نداشت (Kliem et al., 2019). و همچنین به‌طور مشابه سوزا و لاک (Souza and Lock, 2019) در مطالعه‌ای

جدول ۳- اثر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر کیفیت آغوز گاوهای هلشتاین

Table 3- The effect of supplemented different sources of unsaturated and saturated fatty acid in the expectancy diet on the colostrum quality of Holstein cows

متغیر Parameter	جیره‌های آزمایشی Experimental diets			انحراف خطای استاندارد SEM	سطح احتمال معنی‌داری P- value
	شاهد Control	روغن پالم Palm oil	دانه گلرنگ Safflower seed		
حجم آغوز (لیتر) Colostrum volume (liter)	4.19	5.23	5.82	0.661	0.231
چربی آغوز (درصد) Colostrum fat (%)	6.73	6.72	6.35	1.173	0.966
پروتئین (درصد) protein (%)	13.80	13.17	13.55	0.870	0.878
لاکتوز (درصد) Lactose (%)	3.58	3.80	3.59	0.142	0.489
کل مواد جامد (درصد) Ts ¹ (%)	26.02	25.45	26.95	1.389	0.746
ماده جامد بدون چربی (درصد) SNF ² (%)	18.98	19.01	20.07	1.074	0.719
ایمونوگلوبولین G IgG (gr/l)	66.23	66.91	65.48	4.891	0.980
بریکس آغوز (درصد) Colostrum brix (%)	21.02	21.75	21.25	1.288	0.920

¹ TS: کل مواد جامد

² SNF: ماده جامد بدون چربی

SEM: انحراف خطای استاندارد

P-value: سطح احتمال معنی‌داری (P < 0.05)

¹ TS: Total Solid

² SNF: Solid non-Fat

SEM: Standard Error of Mean

P-value: (P < 0.05)

انتظار زایش بر اسید چرب آغوز گاوهای هلشتاین در جدول ۴ گزارش شده است. نتایج نشان داد که اسیدهای چرب آغوز گاوهای هلشتاین به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند ($P > 0.05$).

فاکتورهای تغذیه‌ای و ژنتیکی بر مشخصات اسید چرب شیر در گاو تأثیرگذار است (Fallon et al., 2007). مطابق با نتایج این آزمایش، دوره و آرمانتانو (Dorea and Armantano, 2017) گزارش کردند که مخلوط اسیدهای چرب خوراک به‌طور قابل‌توجهی بر عملکرد کل اسید چرب شیر تأثیر معنی‌داری نمی‌گذارد. در مطالعه‌ای، محققین گزارش کردند که استفاده از منابع امگا ۶ و امگا ۳ در میش‌های نزدیک زایش باعث افزایش غلظت آلفالینولینیک اسید در آغوز تیمار امگا ۳ شد (Capper et al., 2006). استفاده از اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب غیر اشباع (امگا ۶) به‌مقدار ۱/۷ درصد ماده خشک خوراک در دوره نزدیک زایش تأثیر معنی‌داری بر پروفایل اسیدهای چرب آغوز نداشت (Garcia et al., 2014). در تحقیق دیگری مشخص گردید که افزودن مکمل چربی به جیره گاوهای هلشتاین بر کل اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه تأثیر معنی‌داری نداشت (Watts et al., 2013). از طرفی، محققین بیان کردند که افزودن روغن پالم که غنی از اسید چرب اشباع است (C16:0) محتوای چربی شیر را در گاو افزایش می‌دهد (Mosley et al., 2007). محتوای چربی شیر و ترکیب اسید چرب بسته به نوع و مقدار چربی مکمل و بی‌اثر بودن نسبی آن در شکمبه متفاوت خواهد بود (Rabiee et al., 2012). از طرفی، گاوهای شیری پر تولید معمولاً دوره‌ای از تعادل انرژی منفی را در حوالی زایمان تجربه می‌کنند، بنابراین انرژی جیره برای پاسخگویی به نیازهای انرژی بسیج می‌شوند (Watts et al., 2013) که احتمالاً تحت تأثیر قرار نگرفتن ترکیب اسید چرب آغوز به همین دلیل بوده است.

تأثیر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر فراسنجه‌های خونی گوساله‌های هلشتاین در جدول ۵ گزارش شده است. نتایج نشان داد، هیچ‌کدام از فراسنجه‌های خونی گوساله‌ها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$)؛ اما زمان‌های مختلف خون‌گیری بر فراسنجه‌های خونی (گلوکز، کلسترول، تری‌گلیسرید، آسپاراتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، آلبومین، پروتئین کل، کلسیم، فسفر و لیپوپروتئین با چگالی بالا) تأثیرگذار بود ($P < 0.05$).

تأثیر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر کیفیت آغوز گاوهای هلشتاین در جدول ۳ گزارش شده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده حجم، چربی، پروتئین، لاکتوز، کل مواد جامد، ماده جامد بدون چربی، ایمونوگلوبولین G و بریکس آغوز به‌طور معنی‌دار تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$).

مطابق با نتایج به‌دست‌آمده در این آزمایش، محققین بیان کردند که افزودن دانه گلرنگ خام و فرآوری شده به جیره گاوهای هلشتاین بر مقدار تولید شیر، چربی شیر، پروتئین و لاکتوز تأثیر معنی‌داری نداشته است (Paya and Taghizadeh, 2020). افزودن اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب امگا ۶ در دوره نزدیک زایش باعث افزایش غلظت ایمونوگلوبولین G در سرم گوساله‌های متولد شده شد (Garcia et al., 2014). نوک و همکاران (Nowak et al., 2012) گزارش کردند سطوح بالای انرژی در دوره خشکی تأثیری بر کیفیت ایمونوگلوبولین‌های آغوز نداشت. همچنین در تحقیق دیگری مشخص گردید که افزودن مکمل چربی به جیره گاوهای هلشتاین تأثیر معنی‌داری بر درصد چربی شیر، پروتئین، لاکتوز، مواد جامد بدون چربی و تعداد سلول‌های سوماتیک نداشت (Watts et al., 2013). در تحقیق دیگری نشان داده شد که افزودن روغن پالم به جیره گاوهای هلشتاین بر میزان چربی شیر تأثیر معنی‌داری نداشت (Oyebade et al., 2020). به‌علاوه در مطالعه‌ای که اثرات سطوح مختلف دانه گلرنگ بر عملکرد گاوهای هلشتاین منطقه مدیترانه انجام گرفت، نتایج نشان داد که دانه گلرنگ تأثیری بر حجم تولید شیر و چربی شیر نداشت (Oguz et al., 2014). صالحی و همکاران (Salehi et al., 2016) در مطالعه‌ای در گاوهای انتظار زایش (۳۵ روز مانده به زایش) تغذیه منابع امگا ۹ و امگا ۶ را مورد بررسی قرار دادند و مشاهده نمودند که گاوهایی که از منابع امگا ۶ استفاده کرده بودند، میزان پروتئین آغوز بالاتر و همچنین ارزش بریکس بالاتری نسبت به تیمارهای دیگر داشتند که با نتایج ما همسو نبود. در برخی تحقیقات هم نشان داده شد که مکمل چربی بر میزان لاکتوز تأثیر معنی‌داری نداشت (Martin et al., Gonthier et al., 2005; Pirondini et al., 2008). میزان تأثیرگذاری مکمل روغن به‌میزان استفاده و تأثیرات متقابل مکمل با سایر اجزای جیره بستگی دارد (Nudda et al., 2014)، که همین امر ممکن است دلیل تحت تأثیر قرار نگرفتن کیفیت آغوز گاوهای هلشتاین باشد.

تأثیر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره

جدول ۴- اثر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر پروفایل اسیدهای چرب آغوز گاوهای هلشتاین (گرم اسید چرب در ۱۰۰ گرم چربی)
Table 4- The effect of supplemented different sources of unsaturated and saturated fatty acids in the expectant diet on the fatty acid of colostrum of Holstein cows (g fatty acids in 100 g fat)

متغیر Parameter	جیره‌های آزمایشی Experimental diets			انحراف خطای استاندارد SEM ¹	سطح احتمال معنی‌داری P value ²
	شاهد Control	روغن پالم Palm oil	دانه گلرنگ Seed safflower		
	C4:0	0.60	0.71		
C6:0	0.76	0.73	0.76	0.063	0.935
C8:0	0.55	0.50	0.56	0.044	0.593
C10:0	1.34	1.15	1.35	0.141	0.511
C11:0	0.06	0.05	0.06	0.013	0.576
C12:0	2.28	1.87	2.26	0.212	0.301
اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (C4:0-C12:0) Short chain fatty acids (C4:0-C12:0)	5.61	5.04	5.51	0.484	0.679
C13:0	0.05	0.04	0.06	0.009	0.410
C14:0	10.62	9.10	10.12	0.841	0.443
C14:1	0.54	0.41	0.47	0.108	0.713
C15:0	0.91	0.78	0.98	0.096	0.316
C16:0	36.47	37.51	33.73	2.066	0.414
C16:1	2.32	2.37	2.09	0.179	0.505
C17:0	0.94	0.82	0.98	0.105	0.543
C17:1	0.39	0.35	0.32	0.05	0.631
اسیدهای چرب متوسط زنجیر (C13:0-C17:1) Medium chain fatty acids (C13:0-C17:1)	52.28	51.40	48.78	2.980	0.704
C18:0	14.50	13.29	16.54	1.859	0.456
C18:1n9t	0.68	0.79	1.05	0.335	0.728
C18:1n9c	19.81	23.41	21.05	4.088	0.829
C18:2n6t	0.11	0.11	0.14	0.015	0.295
C18:2n6c	3.95	3.54	4.26	0.221	0.093
C20:0	0.29	0.25	0.30	0.041	0.676
C18:3n6	0.04	0.04	0.06	0.008	0.168
C20:1	0.10	0.13	0.09	0.018	0.478
C18:3n3	0.55	0.50	0.50	0.046	0.714
C21:0	0.1	0.11	0.16	0.065	0.686
C20:2	0.04	0.04	0.05	0.014	0.661
C22:0	0.08	0.07	0.07	0.017	0.945
C20:3n6	0.41	0.41	0.39	0.075	0.982
C20:3n3	0.00	0.00	0.00	0.003	0.397
C20:4n6	0.70	0.58	0.66	0.101	0.700
C22:2	0.04	0.04	0.05	0.015	0.951
C20:5n3	0.17	0.14	0.16	0.021	0.601
C22:6n3	0.03	0.01	0.04	0.020	0.501
اسیدهای چرب بلند زنجیر (C18) Long chain fatty acids (C18>)	41.79	43.53	45.65	3.339	0.731
اسیدهای چرب سنتز شده به صورت دنوو (C16>) De novo fatty acids (C16>)	17.76	15.38	17.16	1.340	0.456
C16:0	36.47	37.51	33.73	2.066	0.414
اسیدهای چرب منشأ گرفته از خون (C16>) Performed fatty acids (C16>)	45.45	47.09	49.07	3.191	0.742

¹ میانگین خطای استاندارد

² سطح احتمال معنی دار شدن P=0/05

1 Standard error of mean

2 Probability value p=0/05

جدول ۵- اثر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر فراسنجه‌های خونی گوساله‌های هلشتاین

Table 5- The effect of using the sources of unsaturated and saturated fatty acids in the expectant diet on blood parameters of Holstein calves

فراسنجه‌های خونی Blood parameters	جیره‌های آزمایشی Experimental diets			SEM ^۱	P value ^۲		
	شاهد Control	روغن پالم Palm oil	دانه گلرنگ Seed safflower		Treatment	Time	Treatment×time
گلوکز (میلی‌گرم / دسی لیتر) Glucose (mg/dl)	87.67	91.74	81.16	3.061	0.085	<0.00 1	0.733
کلسترول (میلی‌گرم / دسی لیتر) Cholesterol (mg/dl)	64.05	62.82	64.39	4.216	0.926	<0.00 1	0.631
تری‌گلیسرید (میلی‌گرم / دسی لیتر) Triglyceride (mg/dl)	31.67	31.71	26.44	2.340	0.227	<0.00 1	0.632
نیترژن اوره‌ای خون Blood urea nitrogen (mg/dl)	28.17	25.48	26.04	1.895	0.584	0.107	0.979
آسپاراتات آمینوترانسفراز (u/l) AST (u/l)	58.20	55.26	55.20	4.438	0.863	<0.00 1	0.543
آلانین آمینوترانسفراز (u/l) ALT (u/l)	13.71	15.09	13.33	1.437	0.669	0.000 5	0.215
ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام TAC (mmol/l)	0.537	0.540	.521	0.027	0.877	0.015	0.772
آلبومین (گرم / دسی لیتر) Albumin (gr/dl)	3.27	3.17	3.15	0.066	0.460	<0.00 1	0.914
پروتئین کل (گرم / دسی لیتر) Total protein (gr/dl)	6.18	6.17	6.03	0.254	0.891	<0.00 1	0.584
کلسیم (میلی‌گرم / دسی لیتر) Ca (mg/dl)	11.48	11.43	11.40	0.213	0.966	0.001	0.125
منیزیم (میلی‌گرم / دسی لیتر) Mg (mg/dl)	2.32	2.36	2.34	0.082	0.932	0.919	0.516
فسفر (میلی‌گرم / دسی لیتر) P (mg/dl)	6.97	7.11	7.15	0.168	0.741	0.001	0.679
لیپوپروتئین با چگالی بالا HDL(mg/dl)	19.94	17.61	18.35	1.94	0.693	<0.00 1	0.015
مالون دی‌آلدئید MDA(nmol/ml)	2.06	1.68	2.19	0.193	0.191	0.177	0.087

^۱ میانگین خطای استاندارد^۲ سطح احتمال معنی دار شدن P=0.05^۱ Standard error of mean^۲ Probability value p=0.05

تأثیر معنی‌داری شد (Uken et al., 2021). برخلاف نتایج این آزمایش، در تحقیقی اثرات مکمل اسیدهای چرب ضروری در اواخر دوران آبستنی و دوره‌های پیش از شیرگیری و اوایل شیرگیری بر پروتئین کل در گوساله‌های شیری در زمان‌های مختلف تأثیر معنی‌داری نداشت (Jolazadeh et al., 2019). در مطالعه‌ای که ۴۲ روز مانده به زایش و با سه تیمار با انرژی کم، متوسط و زیاد انجام شد، مشخص گردید گوساله‌هایی که از جیره با انرژی بالا استفاده کرده‌اند، غلظت گلوکز، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل و سوپراکسیددیسموتاز بالاتری نسبت به تیمار با انرژی پایین داشتند،

مطابق با نتایج این آزمایش، در مطالعه‌ای محققین بیان کردند که مکمل سازی گلرنگ بر گوساله‌های فریزین باعث تأثیر معنی‌داری بر سطح آلبومین، پروتئین کل، ایموگلوبین، گلوکز، کلسترول، آسپاراتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و لیپوپروتئین با چگالی بالادر زمان‌های مختلف پرورش (۳۰، ۴۵، ۶۰، ۷۵، ۹۰ و ۱۰۵ روزگی) شد (El-Hafeez et al., 2017). همچنین، در مطالعه دیگری نشان داده شد که استفاده از اسیدهای چرب ضروری و اسید لینولئیک کونژوگه در دوره انتظار زایش بر میزان گلوکز، لاکتات، پروتئین کل و تری‌گلیسرید گوساله‌های نوزاد در طول زمان‌های مختلف پرورش باعث

با توجه به نتایج به دست آمده، وزن بدن گوساله (تولد، ۲۱ و ۴۹ روزگی)، افزایش وزن (۳ تا ۲۱ روزگی و ۳ تا ۴۹ روزگی)، ماده خشک مصرفی (۳ تا ۲۱ روزگی و ۳ تا ۴۹ روزگی)، مجموع مواد خوراکی مصرفی (۳ تا ۲۱ روزگی و ۳ تا ۴۹ روزگی) و بازده خوراک (۳ تا ۲۱ روزگی و ۳ تا ۴۹ روزگی) گوساله‌های هلشتاین به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$).

همچنین غلظت مالون دی آلدئید در تیمار با انرژی پایین به‌طور معنی‌داری نسبت به تیمارهای دیگر افزایش پیدا کرد (Hao Chen *et al.*, 2022). تأثیر زمان بر فراسنجه‌های خونی ممکن است به دلیل بهبود سیستم گوارشی و عملکرد روده در گوساله‌ها باشد. اثر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر عملکرد گوساله‌های هلشتاین در جدول ۶ گزارش شده است.

جدول ۶- اثر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر عملکرد گوساله‌های هلشتاین

Table 6 - The effect of using the sources of unsaturated and saturated fatty acids in the expectant diet on the performance of Holstein calves

متغیر Parameter	جیره‌های آزمایشی Experimental diets			SEM ¹	P value ²
	شاهد Control	روغن پالم Palm oil	دانه گلرنگ Seed safflower		
وزن بدن در روز صفر (kg) Body weight on day 0 (kg)	42.06	40.90	41.34	1.779	0.906
وزن بدن در روز ۲۱ (kg) Body weight on day 21 (kg)	44.94	44.81	44.51	1.677	0.982
وزن بدن در روز ۴۹ (kg) Body weight on day 49 (kg)	56.28	56.12	56.53	1.895	0.989
افزایش وزن (۳ تا ۲۱ روزگی) (kg/day) Average daily gain (3 to 21 days) (kg/day)	0.13	0.18	0.15	0.048	0.778
افزایش وزن (۳ تا ۴۹ روزگی) (kg/day) Average daily gain (3 to 49 days) (kg/day)	0.29	0.31	0.30	0.031	0.875
ماده خشک مصرفی روزانه (۳ تا ۲۱ روزگی) (kg/day) Dry matter intake daily (3 to 21 days) (kg/day)	0.06	0.08	0.06	0.013	0.345
ماده خشک مصرفی روزانه (۳ تا ۴۹ روزگی) (kg/day) Dry matter intake daily (3 to 49 days) (kg/day)	0.27	0.30	0.28	0.017	0.653
مجموع مواد خوراکی مصرفی (۳ تا ۲۱ روزگی) (kg/day) Total feed intake (3 to 21 days) (kg/day)	0.60	0.62	0.60	0.013	0.345
مجموع مواد خوراکی مصرفی (۳ تا ۴۹ روزگی) (kg/day) Total feed intake (3 to 49 days) (kg/day)	0.81	0.84	0.82	0.016	0.653
بازده خوراک (۳ تا ۲۱ روزگی) (درصد) Feed efficiency (3 to 21 days) (%)	0.23	0.29	0.26	0.078	0.865
بازده خوراک (۳ تا ۴۹ روزگی) (درصد) Feed efficiency (3 to 49 days) (%)	0.35	0.36	0.39	0.037	0.779

¹ میانگین خطای استاندارد

² سطح احتمال معنی دار شدن $P=0.05$

¹ Standard error of mean

² Probability value $p=0.05$

جدول ۷- اثر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر وضعیت اندازه‌های بدنی گوساله‌های هلشتاین
Table 7-The effect of using the sources of unsaturated and saturated fatty acids in the expectant diet on skeletal status of Holstein calves

متغیر Parameter	جیره‌های آزمایشی Experimental diets			SEM ¹	P- value ²
	شاهد Control	روغن پالم Palm oil	دانه گلرنگ Seed safflower		
	ارتفاع هیپ ۳ روزگی (سانتیمتر) Hip height on day 3 (cm)	81.69	81.42		
ارتفاع هیپ ۲۱ روزگی (سانتیمتر) Hip height on day 21 (cm)	83.70	84.47	84.20	0.709	0.757
ارتفاع هیپ ۴۹ روزگی (سانتیمتر) Hip height on day 49 (cm)	84.32	86.25	85.66	0.606	0.111
عرض هیپ ۳ روزگی (سانتیمتر) Hip width on day 3 (cm)	24.17	23.62	25.34	0.760	0.311
عرض هیپ ۲۱ روزگی (سانتیمتر) Hip width on day 21 (cm)	26.97	27.28	29.08	0.751	0.126
عرض هیپ ۴۹ روزگی (سانتیمتر) Hip width on day 49 (cm)	29.33	30.35	30.65	0.603	0.291
ارتفاع جدوگاه ۳ روزگی (سانتیمتر) Withers height on day 3 (cm)	80.74	79.48	79.27	0.681	0.283
ارتفاع جدوگاه ۲۱ روزگی (سانتیمتر) Withers height on day 21 (cm)	82.61	82.45	81.61	0.730	0.594
ارتفاع جدوگاه ۴۹ روزگی (سانتیمتر) Withers height on day 49 (cm)	84.48	84.05	83.93	1.007	0.922
دور سینه ۳ روزگی (سانتیمتر) Heart girth on day 3 (cm)	80.35	79.01	80.65	0.999	0.528
دور سینه ۲۱ روزگی (سانتیمتر) Heart girth on day 21 (cm)	82.23	80.55	81.47	0.865	0.444
دور سینه ۴۹ روزگی (سانتیمتر) Heart girth on day 49 (cm)	83.79	83.91	83.92	1.063	0.995
طول بدن ۳ روزگی (سانتیمتر) Body length on day 3 (cm)	47.81	46.32	45.91	0.710	0.163
طول بدن ۲۱ روزگی (سانتیمتر) Body length on day 21 (cm)	49.06	47.96	47.95	0.591	0.341
طول بدن ۴۹ روزگی (سانتیمتر) Body length on day 49 (cm)	50.98	49.28	49.15	0.595	0.076

¹ میانگین خطای استاندارد

² سطح احتمال معنی دار شدن P=0/05

¹ Standard error of mean

² Probability value p=0.05

افزودن مکمل چربی به جیره بر افزایش وزن اولیه و بازده خوراک در گوساله‌های هلشتاین در تیمارهای مختلف تأثیر معنی‌داری نداشت (Melendez *et al.*, 2022). به‌علاوه جولازاده و همکاران گزارش کردند که افزودن مکمل اسیدهای چرب ضروری در اواخر آبستنی و دوره پیش از شیرگیری در گوساله‌های هلشتاین بر ماده خشک مصرفی اولیه، عملکرد رشد و وزن بدن در بدو تولد تحت تأثیر جیره غذایی قبل از زایمان قرار نگرفت (Jolazadeh *et al.*, 2019)، که با نتایج به‌دست آمده در این آزمایش همسو بودند. این احتمال وجود

در مطالعه‌ای نشان داده شد که تغذیه با منابع مختلف چربی در دوره آبستنی بر وزن تولد گوساله‌ها در بین تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی‌داری ندارد (Petit and Berthiaume, 2006). به‌طور مشابه، تغذیه دانه گلرنگ ۵۶ روز قبل از زایش هیچ تأثیری بر افزایش وزن گوساله و وزن از شیر گرفتن آن‌ها نداشت (Geary *et al.*, 2002). علاوه بر این، محققین دیگر بیان کردند که تغذیه با دانه‌های گلرنگ از ۵۰ تا ۵۶ روز قبل از زایمان تأثیر معنی‌داری بر وزن تولد گوساله و وزن از شیر گرفتن آن‌ها ندارد (Encinias *et al.*, 2001). همچنین،

مختلف اسیدهای چرب در جیره غذایی بر گوساله‌های هلشتاین در دوران قبل و بعد از شیرگیری و اندازه‌های بدنی تأثیر معنی‌داری نداشت (Kadkhoday et al., 2017). همچنین در مطالعه دیگری که اثر منابع مختلف چربی در گوساله‌های شیری هلشتاین بررسی شد، نتایج نشان داد که منابع چربی بر شاخص رشد اسکلتی (ارتفاع بدن، عرض هیپ، عرض پین و نسبت هیپ به پین) تأثیر معنی‌داری نداشت (Mohtashami et al., 2022)؛ که ممکن است به دلیل تفاوت در روش‌های آزمایش، سطح شیر مصرفی، نوع و سطح مکمل چربی، نوع خوراک آغازین و مدیریت نگهداری گوساله‌ها خصوصیات رشد اسکلتی تحت تأثیر قرار نگرفته باشند (Ghasemi et al., 2017).

نتیجه‌گیری کلی

به‌طور کلی، می‌توان نتیجه گرفت که افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها تأثیر منفی نداشت، همچنین تیمارهای آزمایشی بر کیفیت آغوز، اسیدهای چرب آغوز، عملکرد و اندازه‌های بدنی گوساله‌های هلشتاین تأثیر معنی‌داری نداشت. با توجه به اینکه اثرات مادری بخشی از کار تحقیقاتی بود، در کل می‌توان توصیه کرد که استفاده از دانه گلرنگ در دوره انتقال گاوهای شیری تأثیر مثبت بر تولید شیر دوره بعد و پارامترهای تولید مثلی بدون تأثیر بر مصرف ماده خشک گاوها داشت، لذا توصیه می‌شود تا سطح پنج درصد ماده خشک در جیره گاوهای انتظار زایش از دانه گلرنگ به‌عنوان منبع امگا ۶ استفاده کرد.

دارد که گوساله‌های شاهد از وضعیت کافی و مناسبی از لحاظ اسید چرب برخوردار بودند (Garcia et al., 2014). به همین دلیل عملکرد گوساله با افزایش مصرف اسید چرب تحت تأثیر قرار نگرفت. از طرفی، عواملی مانند شرایط محیطی در نزدیکی زمان زایش، دوره تغذیه با مکمل‌های چربی و جیره غذایی می‌تواند بر وضعیت انرژی گوساله‌ها و گاوها تأثیر بگذارد و در نتیجه، وزن گوساله‌ها را در بدو تولد و بعد از آن را تغییر دهد (Petit et al., 2006).

اثر افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع در جیره انتظار زایش بر اندازه‌های بدنی گوساله‌های هلشتاین در جدول ۷ گزارش شده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده اندازه‌های بدنی گوساله‌های هلشتاین که شامل ارتفاع هیپ (۳، ۲۱ و ۴۹ روزگی)، عرض هیپ (۳، ۲۱ و ۴۹ روزگی)، ارتفاع جدوگاه (۳، ۲۱ و ۴۹ روزگی)، دور سینه (۳، ۲۱ و ۴۹ روزگی) و طول بدن (۳، ۲۱ و ۴۹ روزگی) بود، به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$).

مطابق با نتایج این آزمایش، جولازاده و همکاران (Jolazadeh et al., 2019) بیان کردند که افزودن مکمل اسیدهای چرب ضروری در اواخر آبستنی و دوره پیش از شیرگیری در گوساله‌های هلشتاین بر طول بدن، عرض هیپ و دور سینه در روز ۳، ۵۶ و ۷۷ روزگی تحت تأثیر جیره غذایی قبل از زایمان قرار نگرفت. از طرفی، محققین با بررسی تأثیر مکمل‌های چربی در گوساله‌ها بیان کردند که عرض و ارتفاع کپل، طول بدن و ارتفاع جدوگاه در گوساله‌ها تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت (Ghasemi et al., 2017). در تحقیق دیگری، محققین نشان دادند که منابع چربی و نسبت‌های

References

- Abuelo, A. (2020). Symposium review: Late-gestation maternal factors affecting the health and development of dairy calves. *Journal of Dairy Science*, 103(4), 3882-3893. <https://doi.org/10.3168/jds.2019-17278>
- Alizadeh, A. R., Ghorbani, G. R., Alikhani, M., Rahmani, H. R., & Nikkhah, A. (2010). Safflower seeds in corn silage and alfalfa hay based early lactation diets: A practice within an optimum forage choice. *Animal Feed Science and Technology*, 155(1), 18-24. <https://doi.org/10.1016/j.anifeeds.2009.09.014>
- Allen, M. S. (2000). Effects of diet on short-term regulation of feed intake by lactating dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 83(7), 1598-1624. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(00\)75030-2](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(00)75030-2)
- Asgharzadeh, F., Nasri, M. F. & Behdani, M. A. (2013). Effects of nitrogen and phosphorus fertilizers on nutritive value of safflower forage and silage. *Journal of Animal and Poultry Sciences*, 3(2), 66-75.
- Bernard, L., H. Fougère, T. Larsen, & Pires, J. (2020). Diets supplemented with starch and corn oil, marine algae, or hydrogenated palm oil differently affect selected metabolite concentrations in cow and goat milk. *Journal of Dairy Science*, 103(6), 5647-5653. <https://doi.org/10.3168/jds.2019-18008>
- Blakely, L. P., Poindexter M.B., Stuart R. L., & Nelson C. D. (2019). Supplementing pasteurized waste-milk with vitamins A, D, and E improves vitamin status of dairy calves. *The Bovine Practitioner*, 53(2), 134-141. <https://doi.org/10.21423/bovine-vol53no2p134-141>
- Cagri, A., and Kara, K. (2018). The Effect of safflower on the in vitro digestion parameters and methane production in horse and ruminant. *Journal of the Faculty of Veterinary Medicine*, 44(2), 73-85. DOI: 10.26650/actavet.2018.409784
- Delir, S., . Mohammad Zadeh H, Taghizadeh, A. & H. Paya. (2020). Effects of application of vitamin-mineral supplement in milk on performances of Holstein suckling calves. *Journal of Animal Science*, 30(3), 105-117. [10.22034/as.2021.38432.1557](https://doi.org/10.22034/as.2021.38432.1557)
- Dorea, J. R. R., and L., Armentano, E. (2017). Effects of common dietary fatty acids on milk yield and concentrations of fat and fatty acids in dairy cattle. *Animal Production Science*, 57(11), 2224-2236.

<https://doi.org/10.1071/AN17335>

10. El-Hafeez, A., Abeer, M. A. Shaarawy, A. M. & Sayed-Ahmed, M. E. (2017). Influence of safflower or sunflower seeds supplementation on growth performance and immune response in suckling Friesian calves. *Journal of the Egyptian Veterinary Medical Association*, 77(4), 693-718.
11. Elsabaawy, E. H. & Gad S. M. (2021). Lipids in Ruminant Nutrition and Its Effect on Human Health. In Precision Agriculture Technologies for Food Security and Sustainability. *Advances in Environmental Engineering and Green Technologies*. 344-367. [Doi.10.4018/978-1-7998-5000-7](https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5000-7)
12. Encinias, H. B., Encinias, A. M. Spickler, J. J. B. Kreft, M. L. Bauer, & Lardy, G. P. (2001). Effects of prepartum high linoleic safflower seed supplementation for gestating cows on performance of cows and calves. In Proceedings of the 5th International Safflower Conference, Williston, North Dakota and Sidney, Montana, USA, 23-27 July, 2001. Safflower: a multipurpose species with unexploited potential and world adaptability (pp. 3-7). Department of Plant Pathology, North Dakota State University.
13. Ergönül, P. G. & Özbek, Z. A. (2020). Cold pressed safflower (*Carthamus tinctorius* L.) seed oil. *Cold Pressed Oils*, 323-333. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818188-1.00029-3>
14. Fallon J. V. O., Busboom, J. R. Nelson, M. L. Gaskins C. T. (2007). A direct method for fatty acid methyl ester synthesis: Application to wet meat tissues, oils and feedstuffs. *Animal Science*, 85(6), 1511-21. [DOI: 10.2527/jas.2006-491](https://doi.org/10.2527/jas.2006-491)
15. Ferlay, A., L. Bernard, A. Meynadier, and Malpuech-Brugère, C. (2017). Production of trans and conjugated fatty acids in dairy ruminants and their putative effects on human health: A review. *Biochimie*, 141, 107-120. [DOI: 10.1016/j.biochi.2017.08.006](https://doi.org/10.1016/j.biochi.2017.08.006)
16. Garcia, M., L. F. Greco, M. G. Favoreto, R. S. Marsola, L. T. Martins, R. S. Bisinotto, J. H. Shin, A. L. Lock, E. Block, Thatcher, W. W. & Santos, J. E. P. (2014). Effect of supplementing fat to pregnant nonlactating cows on colostral fatty acid profile and passive immunity of the newborn calf. *Journal of Dairy Science*, 97(1), 392-405. [DOI: 10.3168/jds.2013-7086](https://doi.org/10.3168/jds.2013-7086)
17. Geary, T. W., Grings, E. E. MacNeil, M. D. & Keisler, D. H. (2002). Effects of feeding high linoleate safflower seeds prepartum on leptin concentration, weaning, and rebreeding performance of beef heifers. *Journal of Animal Science Supplement*, 80(2), 131-132. [DOI: 10.2527/jas.2008-1424](https://doi.org/10.2527/jas.2008-1424)
18. Ghasemi, E., M. Azad-Shahraki, & Khorvash, M. (2017). Effect of different fat supplements on performance of dairy calves during cold season. *Journal of Dairy Science*, 100(7), 5319-5328. [DOI: 10.3168/jds.2016-11827](https://doi.org/10.3168/jds.2016-11827)
19. Gonther, C., A. F. Mustafa, D. R. Ouellet, P. Y. Chouinard, R. Berthiaume, and H. V. Petit. 2005. Feeding micronized and extruded flaxseed to dairy cows: Effects on blood parameters and milk fatty acid composition. *Journal of Dairy Science*, 88(2):748-756. [doi: 10.3168/jds.S0022-0302\(05\)72738-7](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(05)72738-7).
20. Hao Chen, Chunjie Wang, Simujide Huasai & Aorigele Chen. (2022). Effect of prepartum dietary energy density on beef cow energy metabolites, and birth weight and antioxidative capabilities of neonatal calves. *Scientific Reports*. (2022) 12:4828. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-08809-6>
21. Jolazadeh, A. R., Mohammadabadi, T. M. Dehghan-Banadaky, M. Chaji, & Garcia, M. (2019). Effect of supplementation fat during the last 3 weeks of uterine life and the preweaning period on performance, ruminal fermentation, blood metabolites, passive immunity and health of the newborn calf. *British Journal of Nutrition*, 122(12), 1346-1358. [DOI: 10.1017/S0007114519002174](https://doi.org/10.1017/S0007114519002174)
22. Kadkhoday, A., Riasi, A. M. Alikhani, Dehghan-Banadaky, M & R. Kowsar. (2017). Effects of fat sources and dietary C18: 2 to C18: 3 fatty acids ratio on growth performance, ruminal fermentation and some blood components of Holstein calves. *Livestock Science*, 204, 71-77. <https://doi.org/10.1016/j.livsci.2017.08.012>
23. Kliem, K. E., Humphries, D. J., Kirton, P., Givens, D. I. & Reynolds, C. K., (2019). Differential effects of oilseed supplements on methane production and milk fatty acid concentrations in dairy cows. *Animal*, 13(2), 309-317. <https://doi.org/10.1017/S1751731118001398>.
24. Martin, C., J. Rouel, J. P. Jouany, Doreau, M. & Chilliard, Y. (2008). Methane output and diet digestibility in response to feeding dairy cows crude linseed, extruded linseed, or linseed oil. *Journal of Animal Science*, 86(10), 2642-2650. [DOI: 10.2527/jas.2007-0774](https://doi.org/10.2527/jas.2007-0774)
25. Melendez, P., Roeschmann, C. F., Baudo, A. S. Tao, P. Pinedo, A. Kalantari, M. Coarsey, Bernard, J. K. & Naikare, H. (2022). Effect of fish oil and canola oil supplementation on immunological parameters, feed intake, and growth of Holstein calves. *Journal of Dairy Science*, 105, 2509-2520. <https://doi.org/10.3168/jds.2021-21134>
26. Mohtashami, B., Khalilvandi-Behroozyar, H., Pirmohammadi, R. M. Dehghan-Banadaky, M. Kazemi-Bonchenari, E. Dirandeh & Ghaffari, M. H. (2022). The effect of supplemental bioactive fatty acids on growth performance and immune function of milk-fed Holstein dairy calves during heat stress. *British Journal of Nutrition*, 127(2), 188-201. [DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114521000908](https://doi.org/10.1017/S0007114521000908)
27. Mosley, S. A., Mosley, E. E. Hatch, B. Szasz, J. I. Corato, A. N. Zacharias, Howes, D. & McGuire M. A. (2007). Effect of varying levels of fatty acids from palm oil on feed intake and milk production in Holstein cows. *Journal of Dairy Science*, 90(2), 987-993. [DOI: 10.3168/jds.S0022-0302\(07\)71583-7](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(07)71583-7)

28. Nowak, W. Mikula, R., Zachwieja, A. K. Paczyńska, Pecka, K. & Drzazga E. (2012). The impact of cow nutrition in the dry period on colostrum quality and immune status of calves. *Polish Journal of Veterinary Sciences*. 15(1), 77-82. DOI: [10.2478/v10181-011-0117-5](https://doi.org/10.2478/v10181-011-0117-5)
29. Nudda, A., G. Battacone, O. Boaventura Neto, A. Cannas, A. H. D. Francesconi, A. S. Atzori, & Pulina, G. (2014). Feeding strategies to design the fatty acid profile of sheep milk and cheese. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 43, 445-456. <https://doi.org/10.1590/S1516-35982014000800008>
30. Oguz, M. N., Oguz, F. K. & Buyukoglu, T. I. (2014). Effect of different concentrations of dietary safflower seed on milk yield and some rumen and blood parameters at the end stage of lactation in dairy cows. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 43, 207-211. <https://doi.org/10.1590/S1516-35982014000400007>
31. Oyebade, A., L. Lifshitz, H. Lehrer, S. Jacoby, Y. Portnick, and Moallem, U. (2020). Saturated fat supplemented in the form of triglycerides decreased digestibility and reduced performance of dairy cows as compared to calcium salt of fatty acids. *Animal*, 14(5), 973-982. DOI: [10.1017/S1751731119002465](https://doi.org/10.1017/S1751731119002465)
32. Paya, H., & Taghizadeh, A. (2020). Dry matter intake, milk yield and milk fatty acid composition of dairy cows fed raw or microwave irradiated safflower seed as a substitution to cottonseed. *Iranian Journal of Applied Animal Science*, 10(1):51-58. (In Persian).
33. Petit, H. V., & Berthiaume, R. (2006). Effect of feeding different sources of fat during gestation and lactation on reproduction of beef cows and calf performance. *Canadian Journal of Animal Science*, 86(2), 235-243. [Doi.org/10.4141/A05-086](https://doi.org/10.4141/A05-086)
34. Pirondini, M., S. Colombini, M. Mele, L. Malagutti, L. Rapetti, G. Galassi, and G. Crovetto, M. (2015). Effect of dietary starch concentration and fish oil supplementation on milk yield and composition, diet digestibility, and methane emissions in lactating dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 98(1), 357-372. <https://doi.org/10.3168/jds.2014-8092>
35. Rabiee, A. R., K. Breinhild, W. Scott, H. M. Golder, E. Block, & Lean, I. J. (2012). Effect of fat additions to diets of dairy cattle on milk production and components: A meta-analysis and meta-regression. *Journal of Dairy Science*, 95(6), 3225-3247. doi: [10.3168/jds.2011-4895](https://doi.org/10.3168/jds.2011-4895).
36. Salehi R., M. G. Colazo, Oba, M. & Ambrose, D. J. (2016). Effects of prepartum diets supplemented with rolled oilseeds on calf birth weight, postpartum health, feed intake, milk yield and reproductive performance of dairy cow. *Journal of Dairy Science*, 99, 3584-3597. DOI: [10.3168/jds.2015-10186](https://doi.org/10.3168/jds.2015-10186)
37. Souza de, J. and Lock, A. L., (2019). Milk production and nutrient digestibility responses to triglyceride or fatty acid supplements enriched in palmitic acid. *Journal of Dairy science*, 102(5), 4155-4164. DOI: <https://doi.org/10.3168/jds.2018-15690>
38. Terler, G., Poier, G. F. Klevenhusen, and Zebeli, Q. (2022). Replacing concentrates with a high-quality hay in the starter feed in dairy calves: I. Effects on nutrient intake, growth performance, and blood metabolic profile. *Journal of Dairy Science*, 105, 2326-2342. DOI: <https://doi.org/10.3168/jds.2021-21346>
39. Uken, K. L., Vogel, L. Gnot, M. S. Görs, C. T. Schäff, A. Tuchscherer, A. Hoeflich, J. M. Weitzel, E. Kanitz, A. Tröscher, & Sauerwein, H. (2021). Effect of maternal supplementation with essential fatty acids and conjugated linoleic acid on metabolic and endocrine development in neonatal calves. *Journal of Dairy Science*, 104(6), 7295-7314. DOI: [10.3168/jds.2020-20039](https://doi.org/10.3168/jds.2020-20039)
40. Wang, J. P., D. P. Bu, J. Q. Wang, X. K. Huo, T. J. Guo, H. Y. Wei, L. Y. Zhou, R. R. Rastani, L. H. Baumgard, & Li, F. D. (2010). Effect of saturated fatty acid supplementation on production and metabolism indices in heat-stressed mid-lactation dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 93(9), 4121-4127. doi: [10.3168/jds.2009-2635](https://doi.org/10.3168/jds.2009-2635).
41. Watts, J. S., Rezamand, P. D. L. Sevier, Price, W. & McGuire, M. A. (2013). Short-term effects of dietary trans fatty acids compared with saturated fatty acids on selected measures of inflammation, fatty acid profiles, and production in early lactating Holstein dairy cows. *Journal of dairy science*, 96(11):6932-6943. doi: [10.3168/jds.2012-6430](https://doi.org/10.3168/jds.2012-6430).
42. Yao, Y., Yao, J. Z. Du, P. Wang, & Ding, K. (2018). Structural elucidation and immune-enhancing activity of an arabinogalactan from flowers of *Carthamus tinctorius* L. *Carbohydrate polymers*, 202, 134-142. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.08.098>